



ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»

МЦД МЛ

Информационные материалы по мониторингу морского ледяного покрова Арктики и Южного Океана на основе данных ледового картирования и пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR₂

19.10.2020 -27.10.2020

№ 42(476)

Санкт-Петербург 2020

тел. +7(812)337-3149, эл. почта: yms@aari.aq

Адрес в сети Интернет: <http://wdc.aari.ru/datasets/do042/>

Содержание

Северное Полушарие	4
Рисунок 1а – Ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю (цветовая окраска по общей сплоченности)	4
Рисунок 1б – Ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю (цветовая окраска по преобладающему возрасту)	5
Рисунок 1в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов СЛО за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США	6
Рисунок 2а – Обзорная ледовая карта СЛО за текущую неделю и аналогичные периоды 2007-2019.7	7
Рисунок 2б – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института.....	8
Рисунок 2в – Поля распределения средней за 36-часовые промежутки температуры поверхности морского льда и океана Датского метеорологического института	9
Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики по расчетам МЦД МЛ ААНИИ, источник данных EUMETSAT OSISAF, AMSR-2.....	10
Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института.....	11
Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м) (polarportal.dk).....	12
Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Северной полярной области за текущую неделю по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS	13
Таблица 2 – Медианные значения ледовитости для Северной полярной области и 3-х меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2016 гг. и интервалов 2006-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS	13
Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	13
Рисунок 3а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и её трех меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам	16
Рисунок 3б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области с 26.10.1978 по текущий момент времени	17
Рисунок 4 – Медианные распределения сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за те же промежутки за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM.....	18
Южный океан	19
Рисунок 5 а,б – Ледовая карта Южного Океана за последний доступный срок (окраска по общей сплоченности и преобладающему возрасту).....	19,20
Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов Южного Океана за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США	21
Рисунок 5д – Анализ ААНИИ крупных айсбергов Южного океана	22
Таблица 4 – Параметры крупных айсбергов Южного океана на основе анализа ААНИИ	23
Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам	24
Рисунок 7б – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени.	25
Рисунок 8 – Медианные распределения общей сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за тот же промежуток за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	26
Таблица 5 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Южного океана за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS	27
Таблица 6 – Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2016 гг. и интервалов 2007-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM	27

Таблица 7 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.....	27
Земля в целом	
Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS	28
Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS	29
Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения общей сплоченности Арктики и Антарктики с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS	30
Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана	31
Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 гг.....	31
Таблица 9 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017	31
Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS	35
Характеристика исходного материала и методика расчетов	35
Список источников	41

Северное Полушарие




Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО за 22.10.2020-27.10.2020 г. (цветовая раскраска по общей сплощенности) на основе ледового анализа ААНИИ (27.10), Национального ледового центра США (22.10) и повторяемость кромки за 26-31.10 за период 1979-2018 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 16 – Обзорная ледовая карта СЛО за 22.10.2020-27.10.2020 г. (цветовая раскраска по преобладающему возрасту) на основе ледового анализа ААНИИ (27.10), Национального ледового центра США (22.10) и повторяемость кромки за 26-31.10 за период 1979-2018 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 1в – Положение кромки льда и зон разреженных ($<8/10$) и сплоченных ($\geq 8/10$) льдов СЛО за 27.10.2020 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США и повторяемость кромки за 26-31.10 за период 1979-2018 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM)




Рисунок 2а – Обзорная ледовая карта СЛО за 22.10 –27.10.2020 г. и аналогичные периоды 2007-2019 гг. на основе ледового анализа ААНИИ, НИЦ Планета, Канадской ледовой службы и Национального ледового центра США.




Рисунок 26 – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института 17.02.2004-26.10.2020 гг.




Рисунок 2в – Поля распределения средней за 36-часовые промежутки температуры поверхности морского льда и океана Датского метеорологического института на основе статистической обработки ИК-каналов AVHRR ИСЗ MetOp-A за 24.10-26.10 2017-2020 гг. (<http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-temperature/#c8099>)

Ice drift speed for 20201019T1200-20201026T1200




Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики за 19.10-26.10.2020 г., источник данных EUMETSAT OSISAF.

Arctic Sea Ice Volume, 26-Oct-2020






Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института с 01.01.2004 по 26.10.2020 гг.

Oct 22 to Oct 26, 2020



polarportal.org

Oct 22 to Oct 26, 2019



polarportal.org

Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м) за 22.10-26.10.2020 гг. относительно периода 2004-2013 гг. (<http://polarportal.dk>)

Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области за 19.10 – 25.10.2020 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS

Регион	Северная полярная область	Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)	Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)	Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)	Северный Ледовитый океан	Моря СМП (моря Карское-Чукотское)
Разность	342.2	76.7	136.6	129.0	345.9	32.8
тыс.кв.км/сут.	48.9	11.0	19.5	18.4	49.4	4.7

Таблица 2 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области, 3-х меридиональных секторов и моря СМП за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2012-2016 гг. и интервалов 2007-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM

Северная полярная область

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	5048.5	-1270.8	-577.6	-1154.4	-495.2	-125.1	-832.4	-2389.3
		-20.1	-10.3	-18.6	-8.9	-2.4	-14.2	-32.1
19-25.10	5669.3	-2097.3	-755.7	-1776.0	-898.0	-291.3	-1353.3	-2839.2
		-27.0	-11.8	-23.9	-13.7	-4.9	-19.3	-33.4

Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	1208.2	-224.0	-115.7	-121.7	33.5	-162.1	-177.5	-582.6
		-15.6	-8.7	-9.1	2.9	-11.8	-12.8	-32.5
19-25.10	1370.6	-281.0	-61.7	-174.4	129.4	-208.4	-242.0	-714.4
		-17.0	-4.3	-11.3	10.4	-13.2	-15.0	-34.3

Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	928.2	-1166.8	-935.2	-1298.5	-480.0	-436.3	-879.7	-1609.7
		-55.7	-50.2	-58.3	-34.1	-32.0	-48.7	-63.4
19-25.10	1116.0	-1672.8	-1109.5	-1713.5	-696.8	-672.3	-1243.6	-1847.5
		-60.0	-49.9	-60.6	-38.4	-37.6	-52.7	-62.3

Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	2912.0	119.9	473.3	265.8	-48.7	473.3	224.8	-197.0
		4.3	19.4	10.0	-1.6	19.4	8.4	-6.3
19-25.10	3182.7	-143.4	415.5	111.9	-330.7	589.4	132.3	-277.3
		-4.3	15.0	3.6	-9.4	22.7	4.3	-8.0

Северный Ледовитый океан

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	4686.0	-1508.9	-824.7	-1408.3	-739.3	-376.1	-1059.9	-2598.4
		-24.4	-15.0	-23.1	-13.6	-7.4	-18.4	-35.7
19-25.10	5284.4	-2353.1	-1013.7	-2039.7	-1181.2	-568.6	-1596.5	-3045.3
		-30.8	-16.1	-27.8	-18.3	-9.7	-23.2	-36.6

Моря СМП (моря Карское-Чукотское)

Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	51.8	-741.8	-432.2	-907.5	-252.9	-187.7	-577.9	-1420.3
		-93.5	-89.3	-94.6	-83.0	-78.4	-91.8	-96.5
19-25.10	87.8	-1513.4	-733.2	-1552.7	-527.1	-519.3	-1115.8	-1926.5
		-94.5	-89.3	-94.6	-85.7	-85.5	-92.7	-95.6

Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области, 3 меридиональных секторов и моря СМП за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM

Северная полярная область

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
19-25.10	5524.2 19.10.2020	10245.7 25.10.1982	8508.5	8813.6

Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
19-25.10	1222.7 23.10.2018	2830.0 23.10.1982	2085.0	2170.0

Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
19-25.10	1039.4 19.10.2020	3476.3 21.10.1994	2963.5	3207.7

Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)


Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
19-25.10	2477.5 19.10.2012	4349.7 24.10.1983	3460.0	3493.8

Северный Ледовитый океан


Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
19-25.10	5128.8 19.10.2020	10003.9 25.10.1982	8329.7	8643.7

Моря СМП (моря Карское-Чукотское)


Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
19-25.10	48.2 20.10.2020	2708.6 25.10.1982	2014.3	2253.1




а)



б)



в)



г)





Рисунок 3а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и трех меридиональных секторов за период 26.10.1978 – 25.10.2020 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM: а) Северная полярная область, б) сектор 45°W-95°E (Гренландское – Карское моря), в) сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых – Чукотское и Берингово, Охотское), г) сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика), д) Северный Ледовитый океан, е) Северный морской путь (Карское - Чукотское моря).




Рисунок 3б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области за период 26.10.1978 – 25.10.2020 на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.




Рисунок 4 – Медианные распределения сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки и её разности относительно медианного распределения за те же промежутки за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM.

Южный океан




Рисунок 5а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплощенности) и расположение крупных айсбергов на основе информации совместного ледового анализа НЛЦ США, ААНИИ и НМИ (Норвегия) за 22.10.2020.




Рисунок 56 – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту) и расположение крупных айсбергов на основе информации совместного ледового анализа НЛЦ США, ААНИИ и НМИ (Норвегия) за 22.10.2020.




Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных ($<8/10$) и сплоченных ($\geq 8/10$) льдов Южного океана за 27.10.2020 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США и повторяемость кромки за 26-31.10 за период 1979-2018 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).







Рисунок 5д – Анализ АНИИ крупных айсбергов Южного океана за 17.06.2020.

Таблица 4 – Параметры крупных айсбергов Южного океана на основе анализа ААНИИ за 29.04.2020
 Table 4 - Southern Ocean tabular icebergs dimensions based on AARI analysis for 2020-04-29

Имя/ Name	Длина/Length км/km	Ширина/Width км/km	Площадь/Area кв.км/sq.km	Имя/ Name	Длина/Length км/km	Ширина/Width км/km	Площадь/Area кв.км/sq.km
A68A	156	50	5359	D27	15	11	147
A23A	81	74	3996	B45	17	12	141
D15A	94	44	3587	B42	31	9	138
B22A	81	44	3192	A63	20	6	134
D28	11	9	1765	B15AB	20	7	109
D15B	61	22	1185	B29	20	9	108
B09B	50	19	603	B39	15	7	105
A64	30	20	461	C34	19	9	99
D20A	39	17	455	B49	19	9	97
C15	26	19	341	B46	26	7	96
C21B	22	15	317	C30	17	6	93
C18B	37	7	243	B40	15	9	90
B09I	22	11	221	C33	15	7	88
B09G	22	13	200	B38	11	7	87
B28	19	13	196	C24	20	6	85
B47	19	5	182	C31	17	6	84
A68AA	12	7	174	C29	13	9	83
D23	15	11	164	B37	15	6	82
D26	33	2	149	B48	22	4	62
D21B	20	7	147	B43	19	9	60
C35	23	10	147	A68B	13	7	35
C36	23	16	147				




а)



в)

б)



г)

Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и меридиональных секторов за период 26.10.1978 – 25.10.2020 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM: а) Южный Океан, б) Атлантический сектор (60°W - 30°E , море Уэдделла), в) Индоокеанский сектор (30°E - 150°E , моря Космонавтов, Содружества, Моусона), г) Тихоокеанский сектор (150°E - 60°W , моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок 7б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Южного океана за период 26.10.1978 – 25.10.2020 на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.




Рисунок 8 – Медианные распределения общей сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за тот же промежуток за периоды 1978-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM

Таблица 5 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Южного океана за 19.10 - 25.10.2020 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Индоокеанский сектор	Тихоокеанский сектор
Разность	-162.5	20.1	-4.2	-178.4
тыс.кв.км/сут.	-23.2	2.9	-0.6	-25.5

Таблица 6 - Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2012-2016 гг. и интервалов 2007-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM

Южный Океан

Месяц	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	18596.5	39.3	897.0	793.4	748.9	504.8	126.5	260.5
		0.2	5.1	4.5	4.2	2.8	0.7	1.4
19-25.10	18277.5	31.4	1144.8	743.0	932.1	655.6	241.2	319.6
		0.2	6.7	4.2	5.4	3.7	1.3	1.8

Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)

Месяц	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	7405.4	72.4	-78.2	770.6	553.5	178.6	186.3	147.9
		1.0	-1.0	11.6	8.1	2.5	2.6	2.0
19-25.10	7244.9	-76.2	-35.9	810.1	441.3	5.3	206.0	165.7
		-1.0	-0.5	12.6	6.5	0.1	2.9	2.3

Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)

Месяц	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	4503.1	53.8	364.2	-71.3	-36.4	-105.5	-145.1	-69.7
		1.2	8.8	-1.6	-0.8	-2.3	-3.1	-1.5
19-25.10	4479.5	53.2	439.4	-69.6	122.3	105.2	-83.0	-3.6
		1.2	10.9	-1.5	2.8	2.4	-1.8	-0.1

Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллингсгаузена)

Месяц	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%						
		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2010-2020гг	1978-2020гг
26.09-25.10	6688.0	-86.9	611.0	94.2	231.8	431.7	85.3	182.2
		-1.3	10.1	1.4	3.6	6.9	1.3	2.8
19-25.10	6553.0	54.4	741.2	2.5	368.5	545.1	118.2	157.5
		0.8	12.8	0.0	6.0	9.1	1.8	2.5

Таблица 7 – Экстремальные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по Южный Океан

Южный Океан

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.		Медиана
			Среднее знач.	Медиана	
19-25.10	16851.0 25.10.1986	19069.5 19.10.2013	17957.8	17959.8	

Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.		Медиана
			Среднее знач.	Медиана	
19-25.10	6272.0 25.10.1990	8188.2 19.10.1980	7079.3	7115.0	

Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.		Медиана
			Среднее знач.	Медиана	
19-25.10	3849.3 24.10.1986	5065.1 19.10.1993	4483.1	4445.0	

Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллингсгаузена)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.		Медиана
			Среднее знач.	Медиана	
19-25.10	5757.2 21.10.2016	7166.1 19.10.1990	6395.5	6295.1	




Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости (площади морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по 25.10.2020 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS




Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости (площади распространения морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по 25.10.2020 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS




Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения средней общей сплоченности Арктики и Антарктики с 26.10.1978 по 25.10.2020 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS

Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана

Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2020 гг.

19-25.10

Регион	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%							1978-2020гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2018 г	2019 г	2010- 2020гг	1978- 2020гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	5669.3	-1064.4	-1054.2	-755.7	-898.0	-291.3	-1353.3	-2839.2	5524.2 19.10.2020	10245.7 25.10.1982	8508.5	8813.6
		-15.8	-15.7	-11.8	-13.7	-4.9	-19.3	-33.4				
Сектор 45°W- 95°E	1370.6	-394.5	-81.7	-61.7	129.4	-208.4	-242.0	-714.4	1222.7 23.10.2018	2830.0 23.10.1982	2085.0	2170.0
		-22.3	-5.6	-4.3	10.4	-13.2	-15.0	-34.3				
Гренландское море	426.9	-108.9	-66.1	33.5	44.4	-0.1	18.0	-40.8	229.2 19.10.2017	662.5 22.10.1995	467.7	470.8
		-20.3	-13.4	8.5	11.6	0.0	4.4	-8.7				
Баренцево море	1.6	-40.5	-3.2	-12.6	0.8	-63.0	-43.6	-176.2	0.0 19.10.2018	497.5 23.10.1982	177.8	150.8
		-96.2	-66.7	-88.8	109.4	-97.5	-96.5	-99.1				
Карское море	23.2	-158.7	-27.5	-2.0	-5.2	-29.8	-183.9	-425.6	8.1 19.10.2018	839.2 19.10.1998	448.9	539.5
		-87.2	-54.2	-7.9	-18.4	-56.2	-88.8	-94.8				
Сектор 95°E- 170°W	1116.0	-786.7	-1549.3	-1109.5	-696.8	-672.3	-1243.6	-1847.5	1039.4 19.10.2020	3476.3 21.10.1994	2963.5	3207.7
		-41.3	-58.1	-49.9	-38.4	-37.6	-52.7	-62.3				
Море Лаптевых	35.4	-577.7	-415.1	-363.3	-102.5	-320.6	-390.5	-566.4	14.0 20.10.2020	674.3 19.10.1979	601.8	674.3
		-94.2	-92.2	-91.1	-74.3	-90.1	-91.7	-94.1				
Восточно- Сибирское море	18.0	-172.4	-587.9	-317.5	-420.7	-174.7	-490.9	-747.4	5.0 19.10.2020	915.1 19.10.1979	765.4	912.6
		-90.5	-97.0	-94.6	-95.9	-90.6	-96.5	-97.6				
Чукотское море	11.2	4.2	-184.4	-50.3	1.3	5.7	-50.5	-187.1	3.6 20.10.2018	522.7 24.10.1983	198.2	196.4
		59.1	-94.3	-81.8	12.8	103.4	-81.9	-94.4				
Берингово море	21.4	5.8	13.6	10.8	13.3	15.1	12.4	0.5	1.2 19.10.2017	77.7 19.10.2004	20.9	17.1
		37.5	173.2	101.5	163.6	241.8	137.5	2.3				
Сектор 170°W- 45°W	3182.7	116.7	576.8	415.5	-330.7	589.4	132.3	-277.3	2477.5 19.10.2012	4349.7 24.10.1983	3460.0	3493.8
		3.8	22.1	15.0	-9.4	22.7	4.3	-8.0				
Море Бофорта	425.5	104.1	343.7	252.1	-19.0	188.3	154.1	38.4	59.6 19.10.2012	486.6 19.10.1983	387.1	440.0
		32.4	420.1	145.4	-4.3	79.4	56.8	9.9				
Гудзонов залив	10.2	-8.5	-1.5	-2.3	-3.6	-7.3	-6.2	-17.2	6.5 25.10.2019	95.6 20.10.1981	27.4	22.2
		-45.7	-12.5	-18.2	-26.0	-41.8	-38.1	-62.9				
Море Лабрадор	0.0	-4.7	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.9	-8.9	0.0 19.10.2011	44.6 21.10.1991	8.9	6.9
		-100.0	-	-100.0	-	-	-100.0	-100.0				
Дейвисов пролив	13.2	4.9	-2.8	6.1	7.1	-0.2	2.2	-5.7	3.6 20.10.2016	142.9 24.10.1983	18.9	12.1
		58.9	-17.3	86.5	115.7	-1.5	20.0	-30.3				
Канадский архипелаг	555.2	-138.4	-58.9	-88.9	-307.1	-14.0	-120.8	-203.8	509.0 23.10.2019	1006.0 25.10.1986	759.0	753.0
		-20.0	-9.6	-13.8	-35.6	-2.5	-17.9	-26.8				

26.09-25.10

Регион	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%							1978-2020гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2018 г	2019 г	2010- 2020гг	1978- 2020гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	5048.5	-383.7	4.3	-577.6	-495.2	-125.1	-832.4	-2389.3	3729.0	10245.7	7437.8	7663.3
		-7.1	0.1	-10.3	-8.9	-2.4	-14.2	-32.1	26.09.2012	25.10.1982		
Сектор 45°W- 95°E	1208.2	-412.9	-110.4	-115.7	33.5	-162.1	-177.5	-582.6	850.6	2830.0	1790.9	1743.7
		-25.5	-8.4	-8.7	2.9	-11.8	-12.8	-32.5	26.09.2013	23.10.1982		
Гренландское море	362.5	-131.3	-67.7	23.1	19.4	16.1	15.5	-48.7	151.9	662.5	411.3	423.6
		-26.6	-15.7	6.8	5.6	4.6	4.5	-11.9	03.10.2017	22.10.1995		
Баренцево море	3.9	-22.5	-2.4	-4.1	0.7	-15.9	-24.3	-109.3	0.0	497.5	113.3	60.2
		-85.1	-38.0	-51.0	20.0	-80.2	-86.0	-96.5	26.09.2012	23.10.1982		
Карское море	15.4	-78.6	-5.5	0.7	0.2	-8.6	-74.6	-282.8	2.5	839.2	298.2	266.6
		-83.6	-26.3	4.7	1.1	-35.9	-82.9	-94.8	01.10.1995	17.10.1998		
Сектор 95°E- 170°W	928.2	-264.8	-670.5	-935.2	-480.0	-436.3	-879.7	-1609.7	693.2	3476.3	2537.9	2769.1
		-22.2	-41.9	-50.2	-34.1	-32.0	-48.7	-63.4	26.09.2007	21.10.1994		
Море Лаптевых	17.1	-368.7	-137.6	-212.7	-28.7	-138.4	-196.3	-423.2	6.4	674.3	440.4	505.1
		-95.6	-88.9	-92.5	-62.6	-89.0	-92.0	-96.1	01.10.2020	26.09.1996		
Восточно- Сибирское море	8.2	-49.5	-171.7	-203.0	-228.8	-46.1	-288.7	-574.1	1.9	915.1	582.3	676.8
		-85.8	-95.4	-96.1	-96.5	-84.9	-97.2	-98.6	02.10.2007	06.10.1983		
Чукотское море	11.1	4.3	-57.9	-17.2	4.5	5.5	-18.2	-140.1	0.6	522.7	151.2	104.5
		63.7	-83.9	-60.8	68.1	96.7	-62.1	-92.7	26.09.2003	24.10.1983		
Берингово море	24.2	12.5	18.4	9.5	6.9	14.9	13.5	5.5	0.0	92.1	18.7	15.3
		106.2	313.1	64.9	39.9	160.2	125.6	29.5	26.09.2000	12.10.1993		
Сектор 170°W- 45°W	2912.0	294.0	785.2	473.3	-48.7	473.3	224.8	-197.0	1692.3	4349.7	3109.0	3126.0
		11.2	36.9	19.4	-1.6	19.4	8.4	-6.3	27.09.2012	24.10.1983		
Море Бафорта	280.6	43.2	244.1	202.0	-56.9	117.6	90.9	-24.3	3.2	486.6	304.9	291.9
		18.2	668.5	256.9	-16.9	72.1	48.0	-8.0	27.09.2012	29.09.1996		
Гудзонов залив	13.5	-4.9	2.8	-1.8	0.5	0.5	-1.4	-11.3	2.3	156.7	24.8	20.4
		-26.9	26.9	-12.0	3.9	4.3	-9.2	-45.7	01.10.2015	05.10.1990		
Море Лабрадор	0.1	-8.4	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.7	-8.2	0.0	44.6	8.4	6.7
		-98.4	-	78.3	583.3	127.8	-83.0	-98.4	26.09.2011	21.10.1991		
Дейвисов пролив	13.9	2.9	-0.9	4.3	3.5	1.5	1.6	-2.8	3.0	142.9	16.7	12.1
		26.4	-6.3	44.2	33.7	12.2	12.6	-16.8	11.10.1991	24.10.1983		
Канадский архипелаг	528.3	20.4	137.5	-7.3	-204.2	9.0	-31.1	-113.4	182.4	1006.0	641.6	665.7
		4.0	35.2	-1.4	-27.9	1.7	-5.6	-17.7	01.10.2012	25.10.1986		

Таблица 9 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 гг.

19-25.10

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2020гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2018 г	2019 г	2010- 2020гг	1978- 2020гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	18277.5	-162.7	-136.2	1144.8	932.1	655.6	241.2	319.6	16851.0 25.10.1986	19069.5 19.10.2013	17957.8	17959.8
		-0.9	-0.7	6.7	5.4	3.7	1.3	1.8				
Атлантический сектор	7244.9	-144.9	34.6	-35.9	441.3	5.3	206.0	165.7	6272.0 25.10.1990	8188.2 19.10.1980	7079.3	7115.0
		-2.0	0.5	-0.5	6.5	0.1	2.9	2.3				
Западная часть моря Уэдделла	2359.5	36.6	91.0	281.4	120.7	-65.3	86.2	94.3	1821.3 24.10.2001	2761.9 19.10.1980	2265.3	2280.0
		1.6	4.0	13.5	5.4	-2.7	3.8	4.2				
Восточная часть моря Уэдделла	4885.4	-181.5	-56.4	-317.2	320.6	70.6	119.8	71.4	3948.1 25.10.1990	5443.3 19.10.1992	4814.0	4833.5
		-3.6	-1.1	-6.1	7.0	1.5	2.5	1.5				
Индоокеанский сектор	4479.5	280.4	-292.0	439.4	122.3	105.2	-83.0	-3.6	3849.3 24.10.1986	5065.1 19.10.1993	4483.1	4445.0
		6.7	-6.1	10.9	2.8	2.4	-1.8	-0.1				
Море Космонавтов	1269.6	246.9	43.2	244.0	-13.3	26.2	-2.8	19.9	887.4 19.10.1996	1610.4 19.10.2010	1249.7	1241.5
		24.1	3.5	23.8	-1.0	2.1	-0.2	1.6				
Море Содружества	1479.8	-46.6	-163.0	167.0	-178.3	74.4	-62.4	-57.8	1279.0 20.10.2016	1799.1 19.10.2014	1537.7	1529.4
		-3.1	-9.9	12.7	-10.8	5.3	-4.0	-3.8				
Море Моусона	1730.1	80.1	-172.2	28.4	314.0	4.6	-17.9	34.3	1069.8 21.10.1989	2237.8 19.10.1993	1695.7	1700.1
		4.9	-9.1	1.7	22.2	0.3	-1.0	2.0				
Тихоокеанский сектор	6553.0	-298.1	121.2	741.2	368.5	545.1	118.2	157.5	5757.2 21.10.2016	7166.1 19.10.1990	6395.5	6295.1
		-4.4	1.9	12.8	6.0	9.1	1.8	2.5				
Море Рассы	5465.8	-757.3	-21.9	345.1	239.3	306.0	24.0	16.8	4694.7 25.10.1991	6277.6 23.10.1999	5449.0	5374.3
		-12.2	-0.4	6.7	4.6	5.9	0.4	0.3				
Море Беллинсгаузена	1087.2	459.2	143.1	396.1	129.2	239.1	94.1	140.7	495.8 24.10.2008	1497.7 20.10.1994	946.4	947.9
		73.1	15.2	57.3	13.5	28.2	9.5	14.9				

26.09-25.10

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2020гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2018 г	2019 г	2010- 2020гг	1978- 2020гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	18596.5	-117.4	-292.5	897.0	748.9	504.8	126.5	260.5	16851.0 25.10.1986	20045.7 26.09.2014	18336.0	18315.5
		-0.6	-1.5	5.1	4.2	2.8	0.7	1.4				
Атлантический сектор	7405.4	-224.2	-69.2	-78.2	553.5	178.6	186.3	147.9	6272.0 25.10.1990	8325.7 26.09.1980	7257.4	7267.0
		-2.9	-0.9	-1.0	8.1	2.5	2.6	2.0				
Западная часть моря Уэдделла	2367.3	-2.9	59.5	297.4	193.5	-119.9	39.9	31.4	1821.3 24.10.2001	3208.0 26.09.1980	2335.9	2320.5
		-0.1	2.6	14.4	8.9	-4.8	1.7	1.3				
Восточная часть моря Уэдделла	5038.1	-221.3	-128.7	-375.6	360.0	298.5	146.4	116.6	3948.1 25.10.1990	5739.9 04.10.1992	4921.5	4941.3
		-4.2	-2.5	-6.9	7.7	6.3	3.0	2.4				

Индоокеанский сектор	4503.1	302.1	-415.0	364.2	-36.4	-105.5	-145.1	-69.7	3849.3	5361.3	4572.8	4524.6
		7.2	-8.4	8.8	-0.8	-2.3	-3.1	-1.5	24.10.1986	08.10.1993		
Море Космонавтов	1307.8	272.1	86.6	227.5	-6.6	30.7	15.6	55.5	874.9	1675.6	1252.3	1237.1
		26.3	7.1	21.1	-0.5	2.4	1.2	4.4	08.10.1996	16.10.2010		
Море Содружества	1465.7	-75.3	-167.4	108.7	-124.9	-18.2	-90.2	-86.9	1193.7	1923.1	1552.6	1552.0
		-4.9	-10.3	8.0	-7.9	-1.2	-5.8	-5.6	27.09.2017	02.10.2014		
Море Моусона	1729.6	105.2	-334.2	28.0	95.1	-118.0	-70.5	-38.4	1057.1	2420.1	1768.0	1764.7
		6.5	-16.2	1.6	5.8	-6.4	-3.9	-2.2	12.10.1989	01.10.1982		
Тихоокеанский сектор	6688.0	-195.3	191.7	611.0	231.8	431.7	85.3	182.2	5651.0	7382.3	6505.8	6477.0
		-2.8	3.0	10.1	3.6	6.9	1.3	2.8	08.10.1987	28.09.2013		
Море Рассы	5570.3	-708.8	-91.6	158.2	201.2	314.0	7.6	73.4	4481.0	6457.4	5496.9	5467.5
		-11.3	-1.6	2.9	3.7	6.0	0.1	1.3	08.10.1987	02.10.2007		
Море Беллинсгаузена	1117.7	513.5	283.3	452.8	30.7	117.8	77.6	108.8	490.4	1707.7	1008.9	1022.6
		85.0	34.0	68.1	2.8	11.8	7.5	10.8	17.10.1998	26.09.2015		

Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS

19-25.10				
Регион	Сев. полярная область	Сектор 45°W-95°E	Гренландское море	Баренцево море
Разность	342.2	76.7	38.3	-6.4
тыс.кв.км/ сут.	48.9	11.0	5.5	-0.9
19-25.10				
Регион	Карское море	Сектор 95°E-170°W	Море Лаптевых	Восточно-Сибирское море
Разность	12.9	136.6	14.9	11.3
тыс.кв.км/ сут.	1.8	19.5	2.1	1.6
19-25.10				
Регион	Чукотское море	Берингово море	Сектор 170°W-45°W	Море Бофорта
Разность	-6.3	-5.5	129.0	121.1
тыс.кв.км/ сут.	-0.9	-0.8	18.4	17.3
19-25.10				
Регион	Гудзонов залив	Море Лабрадор	Дейвисов пролив	Канадский архипелаг
Разность	-6.1	-0.2	-1.8	-6.4
тыс.кв.км/ сут.	-0.9	0.0	-0.3	-0.9
19-25.10				
Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Западная часть моря Уэдделла	Восточная часть моря Уэдделла
Разность	-162.5	20.1	28.6	-8.5
тыс.кв.км/ сут.	-23.2	2.9	4.1	-1.2
19-25.10				
Регион	Индоокеанский сектор	Море Космонавтов	Море Содружества	Море Моусона
Разность	-4.2	-42.3	-26.7	64.7
тыс.кв.км/ сут.	-0.6	-6.0	-3.8	9.2
19-25.10				
Регион	Тихоокеанский сектор	Море Рассы	Море Беллинсгаузена	
Разность	-178.4	-172.8	-5.6	
тыс.кв.км/ сут.	-25.5	-24.7	-0.8	

Характеристика исходного материала и методика расчетов

Для иллюстрации ледовых условий Арктического региона представлены совмещенные региональные карты ААНИИ [4, 6], Канадской ледовой службы – КЛС [12], Национального ледового центра США – НЛЦ [10], при наличии данных, ГМЦ России [8], НИЦ Планета [9] и ледовой службы Германии. Совмещение карт выполнено путем перекрытия слоев (ААНИИ, слой #1), (ГМЦ России или НИЦ Планета, слой #1), (BSH, слой #1) -> (КЛС, слой #2) -> (обзорная карта НЛЦ, слой #3). Как результат, карты ААНИИ характеризуют ледовые условия морей Гренландского...Бофорта, карты ГМЦ России или НИЦ Планета – Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского, Японского, Белого, карты НЛЦ – Северных частей Тихого и Атлантического океанов и Арктического бассейна (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). карты BSH – Балтийского карты КЛС - морей Бофорта, Канадского архипелага, Баффина, Девисова пролива, Лабрадор, Св. Лаврентия (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). Для ледовых условий и распределения айсбергов Южного океана использованы данные проекта по интегрированному ледовому анализу Южного океана – циркумполярные карты ААНИИ [5, 7], НЛЦ [10, 11] и карты акватории Антарктического полуострова Норвежского метеорологического института (НМИ) [21]. Для построения совмещенных карт используется архив данных в обменном формате ВМО СИГРИД-3 [18] Мирового центра данных по морскому льду (МЦД МЛ) – проекта ВМО «Глобальный Банк Цифровых Данных по Морскому Льду». В пределах отдельного срока выборка карт из архива проводилась по критериям близости карт к сроку выпуска карты ААНИИ с максимальным интервалом времени между картами до 7 суток (день недели выпуска карт ААНИИ – вторник, ГМЦ России – среда, НИЦ Планета – понедельник, BSH – понедельник, КЛС – понедельник, НЛЦ – четверг для морского льда и пятница – для крупных айсбергов Южного океана, НМИ - понедельник).

Для иллюстрации полей толщин льда СЛО использованы ежедневные данные по распределению средневзвешенной толщины льда численной модели HYCOM-CICE Датского метеорологического института (ДМИ) [20]. Численная модель HYCOM-CICE имеет разрешение 10x10 км и является совместной моделью морского льда – океана. Портал полярных данных ДМИ [22] используется также как источник данных по оценке объема льда СЛО, температуры поверхности океана/морского льда, аномалий температуры воздуха и поля приземного ветра.

Для иллюстрации ледовых условий Северной Полярной области и Южного океана за последние сутки используются ежедневные циркумполярные ледовые информационные продукты НЛЦ США по оценке расположения кромки льда и ледяных массивов - MIZ (Marginal Ice Zone).

Для цветовой окраски карт использован стандарт ВМО (WMO/Td. 1215) [19] для зимнего (по возрасту) и летнего (по общей сплошности) периодов. Следует также отметить, что в зонах стыковки карт ААНИИ, КЛС и НЛЦ наблюдается определенная несогласованность границ и характеристик ледовых зон вследствие ряда различий в ледовых информационных системах подготавливающих служб. Однако, данная несогласованность несущественна для целей интерпретации ледовых условий в рамках настоящего обзора.

Для получения оценок ледовитости (extent) и приведенной ледовитости – площади льда (area) отдельных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана и климатического положения кромок заданной повторяемости на основе данных спутниковых систем пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS [17] в МЦД МЛ ААНИИ принята следующая технология расчетов:

- источник данных – архивные (Cavalieri et al., 2008, Meier et al., 2006) и квазиоперативные (Maslanik and Stroeve, 1999) с задержкой 1-2 дня ежедневные матрицы (поля распределения) оценок общей сплошности Северной (севернее 45° с.ш.) и Южной (южнее 50° с.ш.) Полярных областей на основе обработанных по алгоритму NASATEAM данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS ИСЗ

NIMBUS-7 и DMSP за период с 26.10.1978 г. по настоящий момент времени [13, 14, 15], копируемые с сервера НЦДСЛ;

- область расчета – Северная и Южная Полярные области и их регионы с использованием масок океан/суша НЦДСЛ (http://nsidc.org/data/polar_stereo/tools_masks.html);
- границы используемых масок расчета отдельных меридиональных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана представлены на рисунках П1 – П6, не совпадают с используемыми в НЦДСЛ масками для отдельных акваторий Мирового океана и основаны на номенклатуре ААНИИ для морей Евразийского шельфа (Гренландское - Чукотское), Атласе Северного ледовитого океана (1980) и Атласе океанов (1980) издательства ГУНИО МО [1, 2, 3].
- вычислительные особенности расчета – авторское программное обеспечение ААНИИ с сохранением точности расчетов и оценке статистических параметров по гистограмме распределения и свободно-распространяемое программное обеспечение GDAL для векторизации полей климатических параметров;

В графическом формате PNG совмещенные карты ААНИИ-КЛС-НЛЦ доступны по адресу <http://wdc.aari.ru/datasets/d0040>.

Результаты расчетов ледовитости Северной, Южной полярных областей, их отдельных меридиональных секторов, морей и частей морей доступны на сервере МЦД МЛ ААНИИ в каталогах соответственно <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/north/extent/> и <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/south/extent/>.




Рисунок П1 – Секторальное деление северной полярной области. 1 - Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря); 2 - Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика); 3 - Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское, Японское)




Рисунок П2 – Северный ледовитый океан в официальных границах




Рисунок П3 – Моря северной полярной области. 1 – Арктический бассейн; 2- Баренцево море; 3 – Карское море; 4 – море Лаптевых; 5 - Восточно-Сибирское море; 6 – Чукотское море; 7 – море Бофорта; 8 – Канадский архипелаг; 9 – море Линкольна; 10 – Гренландское море; 11 – Норвежское море; 12 – Балтийское море; 13 – Белое море; 14 – Берингово море; 15 – Охотское море; 16 – Японское море; 17 – море Баффина; 18 – Дейвисов пролив; 19 – море Лабрадор; 20 – залив Святого Лаврентия; 21 – Гудзонов залив.




Рисунок П4 – Сектора и моря северной полярной области. 1 - Белое море; 2- Балтийское море; 3 – Баренцево море (СВ); 4 – Баренцево море (З); 5 - Баренцево море (ЮВ); 6 – Карское море (СВ); 7 – Карское море (ЮЗ); 8 – море Лаптевых (В); 9 – море Лаптевых (З); 10 – Восточно-Сибирское море (З); 11 – Восточно-Сибирское море (В); 12 –Чукотское море; 13 – Берингово море; 14 – Охотское море; 15 –Гренландское море; 16 – Норвежское море; 17 – Канадский архипелаг; 18 – Гудзонов залив; 19 – Дейвисов пролив; 20 - море Баффина; 21 – море Лабрадор; 22 - залив Святого Лаврентия; 23 - море Линкольна; 24 - море Бофорта; 25 - Японское море; 26 - сектор АО (30° з.д. – 10° в.д.); 27 – сектор АО (10° в.д. – 30° в.д.); 28 - сектор АО (30° в.д. – 65° в.д.); 29 - сектор АО (65° в.д. – 96° в.д.); 30 - сектор АО (96° в.д. – 140° в.д.); 31 - сектор АО (140° в.д. – 180° в.д.); 32 - сектор АО (180° в.д. – 156° з.д.); 33 - сектор АО (156° з.д. – 123° з.д.); 34 - сектор АО (123° з.д. – 30° з.д.).




Рисунок П5 – Секторальное деление Южного океана. 1 - Атлантический сектор (60°W - 30°E , море Уэдделла); 2 - Индоокеанский сектор (30°E - 150°E , моря Космонавтов, Содружества, Моусона); 3 - Тихоокеанский сектор (150°E - 60°W , моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок П6 – Моря Южного океана. 1 – Западная часть моря Уэдделла; 2- Восточная часть моря Уэдделла; 3 – Море Космонавтов; 4 – море Содружества; 5 – море Моусона; 6 – море Росса; 7 – Море Беллинсгаузена.

Список источников

1. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. – 1980. М: Изд. ГУНИО МО СССР ВМФ – 184 с.
2. Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные таблицы. - Изд. ВМФ МО СССР.-1980.
3. Границы океанов и морей. – 1960. Л.: Изд. ГУНИО ВМФ. – 51 с.
4. Обзорные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» Северного Ледовитого океана за 2008-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
5. Комплексные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» Южного океана за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
6. Комплексные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» арктических и замерзающих морей России за 1997-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0004>.
7. Карты ФГБУ «ААНИИ» анализа крупных айсбергов Южного океана за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
8. Комплексные ледовые карты ФГБУ «Гидрометцентр России» Азовского, Каспийского и Белого морей за 2000-2017 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0033>.
9. Комплексные ледовые карты ФГБУ «НИЦ Планета» Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского и Японского морей за 2016-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0034>.
10. Комплексные ледовые карты Северной полярной области и Южного океана Национального ледового центра США за 2003-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
11. Карты анализа крупных айсбергов Южного океана Национального ледового центра США за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
12. Комплексные ледовые карты Канадской Арктики Канадской ледовой службы за 2006-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0031>.
13. Cavalieri, D., C. Parkinson, P. Gloersen, and H. J. Zwally. 1996, updated 2008. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [1978.10.26 – 2007.12.31]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
14. Meier, W., F. Fetterer, K. Knowles, M. Savoie, M. J. Brodzik. 2006, updated quarterly. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [2008.01.01 – 2008.03.25]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
15. Maslanik, J., and J. Stroeve. 1999, updated daily. *Near-Real-Time DMSP SSM/I-SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations*, [2008.03.26 – present moment]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
16. Andersen, S., R. Tonboe, L. Kaleschke, G. Heygster, and L. T. Pedersen, Intercomparison of passive microwave sea ice concentration retrievals over the high-concentration Arctic sea ice.// *J. Geophys. Res.* – 2007. – Vol. 112. C08004, doi:10.1029/2006JC003543.
17. Статистические характеристики сплошности морского льда Северной полярной области и Южного океана на основе данных наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi>.

18. SIGRID-3: A vector archive format for Sea Ice Georeferenced Information and Data - JCOMM Technical Report Series No. 23, 2014, WMO/TD-No.1214.
19. Ice Chart Colour Code Standard. - JCOMM Technical Report Series No. 24, 2004, WMO/TD-No.1215.
[\(http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914\)](http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914)
20. Danish Meteorological Institute North Atlantic - Arctic Ocean model HYCOM-CICE - <http://ocean.dmi.dk/models/hycom.uk.php>
21. Портал данных ледового анализа Южного океана Норвежского метеорологического института - <http://polarview.met.no/Antarctic.html>
22. Портал полярных данных Датского метеорологического института - <http://polarportal.dk>