



ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»

**МЦД МЛ**

Информационные материалы по мониторингу морского ледяного покрова Арктики и Южного Океана на основе данных ледового картирования и пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR<sub>2</sub>

**03.01.2022 - 11.01.2022**

**№ 02(539)**

**Санкт-Петербург 2022**

*тел. +7(812)337-3149, эл.почта: [vms@aari.aq](mailto:vms@aari.aq)*

Адрес в сети Интернет: <http://wdc.aari.ru/datasets/doo42/>

## Содержание

<b>Северное Полушарие</b> .....	4
Рисунок 1а – Ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю (цветовая окраска по общей сплоченности) .....	4
Рисунок 1б – Ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю (цветовая окраска по преобладающему возрасту) .....	4
Рисунок 1в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов СЛО за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США .....	6
Рисунок 2а – Обзорная ледовая карта СЛО за текущую неделю и аналогичные периоды 2007-2019.	8
Рисунок 2б – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института .....	9
Рисунок 2в – Поля распределения средней за 36-часовые промежутки температуры поверхности морского льда и океана Датского метеорологического института .....	10
Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики по расчетам МЦД МЛ ААНИИ, источник данных EUMETSAT OSISAF, AMSR-2. ....	11
Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института .....	12
Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м) .....	13
Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Северной полярной области за текущую неделю по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	15
Таблица 2 – Медианные значения ледовитости для Северной полярной области и 3-х меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2016 гг. и интервалов 2006-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	15
Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM .....	15
Рисунок 3а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и её трех меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам. ..	18
Рисунок 3б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области с 26.10.1978 по текущий момент времени .....	19
Рисунок 4 – Медианные распределения сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за те же промежутки за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM .....	19
<b>Южный океан</b> .....	20
Рисунок 5 а,б – Ледовая карта Южного Океана за последний доступный срок (окраска по общей сплоченности и преобладающему возрасту) .....	19,21
Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов Южного Океана за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США. ....	22
Рисунок 5д – Анализ ААНИИ крупных айсбергов Южного океана .....	23
Таблица 4 – Параметры крупных айсбергов Южного океана на основе анализа ААНИИ .....	23
Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам .....	25
Рисунок 7б – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени. ....	26
Рисунок 8 – Медианные распределения общей сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за тот же промежуток за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM .....	26
Таблица 5 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Южного океана за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS .....	27
Таблица 6 – Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2016 гг. и интервалов 2007-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM .....	27
Таблица 7 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM .....	27

## **Земля в целом**

Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS .....	28
Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS .....	29
Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения общей сплоченности Арктики и Антарктики с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS .....	30
Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана .....	31
Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 гг.....	31
Таблица 9 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 .....	31
Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS .....	35
Характеристика исходного материала и методика расчетов .....	31
Список источников .....	41

# Северное Полушарие




Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛЮ за 06.01-11.01.2022 г. (цветовая раскраска по общей сплоченности) на основе ледового анализа ААНИИ (11.01), NOAA Аляска (10.01) и Национального ледового центра США (06.01), и повторяемость кромки за 06.01-10.01 за период 1991-2020гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 16 – Обзорная ледовая карта СЮ за 06.01-11.01.2022 г. (цветовая раскраска по преобладающему возрасту) на основе ледового анализа ААНИИ (11.01), NOAA Аляска (10.01) и Национального ледового центра США (06.01), и повторяемость кромки за 06.01-10.01 за период 1991-2020гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 1в – Положение кромки льда и зон разреженных ( $<8/10$ ) и сплоченных ( $\geq 8/10$ ) льдов СЛО за 10.01.2022 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США и повторяемость кромки за 06.01-10.01 за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM)





Рисунок 1г – Оценка сплоченности льда и расположения полыней по данным ИСЗ AMSR2 за 09.01.2022 (верх) и оценка толщин льда по данным ИСЗ CryoSAT-2 – SMOS за 02.01-08.01.2022 (AWI SIRAL).








Рисунок 26 – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана NUCOM/CICE Датского метеорологического института 10.01 за 2004-2022 гг.




Рисунок 2в – Поля распределения средней за 36-часовые промежутки температуры поверхности морского льда и океана Датского метеорологического института на основе статистической обработки ИК-каналов AVHRR ИСЗ MetOp-A за 08-10.01 2019-2022 гг. (<http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-temperature/#c8099>)

## Ice drift speed for 20220102T1200-20220109T1200




Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики за последние 7 суток, источник данных EUMETSAT OSISAF.





Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института с 01.01.2004 по 10.01.2022 гг.


Jan 6 to Jan 10, 2022



ECMWF forecast: 2-m temperature and 10-m wind  
T2m anomaly relative to ERA-Interim 2004-2013

polarportal.org

Jan 6 to Jan 10, 2021




ECMWF forecast: 2-m temperature and 10-m wind  
T2m anomaly relative to ERA-Interim 2004-2013

polarportal.org

Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м) за 06.01 - 10.01 в 2021-2022 гг. относительно периода 2004-2013 гг. (<http://polarportal.dk>)

Jan 6 to Jan 10, 2022



Jan 6 to Jan 10, 2021




Рисунок 2ж – Аномалии приземной суммы осадков за 06.01 - 10.01 в 2021-2022 гг. относительно периода 2004-2013 гг. (<http://polarportal.dk>)

Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области 03.01 – 09.01.2022 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SMIS

Регион	Северная полярная область	Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)	Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)	Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)	Северный Ледовитый океан	Моря СМП (моря Карское-Чукотское)
Разность	392.6	115.5	45.1	231.9	129.8	0.0
тыс.кв.км/сут.	56.1	16.5	6.4	33.1	18.5	0.0


Таблица 2 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области, 3-х меридиональных секторов и моря СМП за текущие 30 и 7-дневные интервалы, и её аномалии от 2016-2020 гг. и интервалов 2011-2021 гг. и 1978-2021 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM

Северная полярная область								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	13036.4	939.0	792.7	618.4	465.0	483.1	477.7	-251.1
		7.8	6.5	5.0	3.7	3.8	3.8	-1.9
03-09.01	13778.9	906.7	1051.4	587.5	548.9	640.5	615.3	-135.4
		7.0	8.3	4.5	4.1	4.9	4.7	-1.0
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	3116.7	742.2	474.5	576.6	113.4	447.1	377.9	-110.9
		31.3	18.0	22.7	3.8	16.7	13.8	-3.4
03-09.01	3336.0	724.4	568.7	524.5	252.9	610.0	484.3	-28.9
		27.7	20.5	18.7	8.2	22.4	17.0	-0.9
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	4044.6	117.7	164.9	117.4	173.5	145.8	114.9	-4.2
		3.0	4.3	3.0	4.5	3.7	2.9	-0.1
03-09.01	4215.5	2.3	180.7	-9.9	31.9	-8.9	19.9	-104.6
		0.1	4.5	-0.2	0.8	-0.2	0.5	-2.4
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	5875.2	79.1	153.3	-75.5	178.0	-109.8	-15.2	-135.9
		1.4	2.7	-1.3	3.1	-1.8	-0.3	-2.3
03-09.01	6227.4	180.0	302.1	72.9	264.1	39.4	111.1	-1.8
		3.0	5.1	1.2	4.4	0.6	1.8	0.0
Северный Ледовитый океан								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	11283.3	585.9	266.1	256.7	-52.5	299.4	193.5	-278.9
		5.5	2.4	2.3	-0.5	2.7	1.7	-2.4
03-09.01	11647.4	575.3	442.4	368.2	120.4	548.9	378.5	-66.9
		5.2	3.9	3.3	1.0	4.9	3.4	-0.6
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	3015.9	191.0	73.1	129.2	31.2	171.0	94.9	25.3
		6.8	2.5	4.5	1.0	6.0	3.2	0.8
03-09.01	3025.9	52.4	51.1	73.5	0.5	107.7	46.1	14.0
		1.8	1.7	2.5	0.0	3.7	1.5	0.5


Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области, 3 меридиональных секторов и моря СМП за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM.

Северная полярная область				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	12612.5 03.01.2018	15172.5 09.01.1979	13914.3	13966.5
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	2418.0 03.01.2016	4473.7 09.01.1982	3364.9	3377.8
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	3908.5 03.01.2014	4781.0 09.01.1995	4320.2	4326.9
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	5512.5 07.01.2011	6882.1 09.01.1983	6229.2	6200.7
Северный Ледовитый океан				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	10900.7 04.01.2016	12563.6 03.01.1979	11714.3	11690.5
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	2840.7 07.01.2021	3025.9 03.01.1979	3011.9	3025.9







а)




б)




в)



г)



д)



е)

Рисунок 3а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и трех меридиональных секторов за период 26.10.1978 - 09.01.2022 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM: а) Северная полярная область, б) сектор 45°W-95°E (Гренландское – Карское моря), в) сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых – Чукотское и Берингово, Охотское), г) сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика), д) Северный Ледовитый океан, е) Северный морской путь (Карское - Чукотское моря).




Рисунок 36 – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области за период 26.10.1978 – 09.01.2022 на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.

# Южный океан




Рисунок 5а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплоченности) и расположение крупных айсбергов на основе информации совместного ледового анализа НЛЦ США, ААНИИ и НМИ (Норвегия) за 06.01.2022.




Рисунок 5б – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту) и расположение крупных айсбергов на основе информации совместного ледового анализа НЛЦ США, ААНИИ и НМИ (Норвегия) за 06.01.2022.




Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных ( $<8/10$ ) и сплоченных ( $\geq 8/10$ ) льдов Южного океана за 10.01.2022 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США и повторяемость кромки за 06-10.01 за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).





Рисунок 5д – Анализ ААНИИ крупных айсбергов Южного океана за 21.03.2021.


Таблица 4 – Линейные размеры крупных айсбергов Южного океана на основе анализа ААНИИ за 25.02.2021 / Table 4 – Southern Ocean tabular icebergs linear dimensions based on AARI analysis for 2021-02-25

Имя/ Name	Длина/ Length км/km	Ширина/ Width км/km	Площадь/ Area кв.км/sq.km	Имя/ Name	Длина/ Length км/km	Ширина/ Width км/km	Площадь/ Area кв.км/sq.km
A23A	74	63	3996	C36	41	28	147
D15A	94	44	3587	D27	15	9	147
B22A	70	44	3192	A63	20	6	144
D28	54	35	1743	A68K	19	4	142
D15B	61	22	1185	B45	13	11	141
A68A	67	24	894	B42	22	7	138
B09B	44	15	603	A68I	35	6	122
D20A	35	17	455	B46	19	7	111
A64	24	17	346	B15AB	20	7	109
C15	22	15	341	B29	20	9	108
A68E	48	13	334	B39	15	7	105
C21B	20	15	317	A68P	48	11	99
A68M	54	19	287	A68N	48	11	97
A69A	19	17	264	C30	17	6	93
C18B	35	7	243	C33	15	7	88
B50	28	11	232	B38	11	7	87
B09I	22	11	211	C24	20	4	85
B09G	20	13	200	C31	17	6	84
B28	17	11	196	C29	9	9	83
B47	22	9	182	B37	15	6	82
A73	17	9	181	A71	15	6	72
A72	20	7	172	B40	11	9	71
A69B	19	13	169	A68G	48	11	64
D23	15	11	164	B49	19	9	60
A70	15	9	159	A68J	24	4	56
D26	35	4	149	A68O	48	11	55
D21B	19	7	147	A68H	20	9	31
C35	13	9	147	A68P	24	4	11







а)



б)



в)



г)

Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и меридиональных секторов за период 26.10.1978 – 09.01.2022 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM: а) Южный Океан, б) Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла), в) Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона), г) Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок 76 – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Южного океана за период 26.10.1978 – 09.01.2022 на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.

Таблица 5 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Южного океана за 03.01 – 09.01.2022г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Индоокеанский сектор	Тихоокеанский сектор
Разность	-1154.2	-507.4	-193.1	-453.8
тыс.кв.км/сут.	-164.9	-72.5	-27.6	-64.8

Таблица 6 - Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2016-2020 гг. и интервалов 2011-2021 гг. и 1978-2021 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM

Южный Океан								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	7136.4	417.6	-445.5	232.5	-422.0	-1404.6	-1195.6	-1353.6
		6.2	-5.9	3.4	-5.6	-16.4	-14.3	-15.9
03-09.01	4767.8	-133.1	-716.6	161.9	-811.7	-1024.0	-1323.7	-1372.0
		-2.7	-13.1	3.5	-14.5	-17.7	-21.7	-22.3
Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	2931.4	344.5	196.5	145.0	170.9	-602.8	-595.7	-682.9
		13.3	7.2	5.2	6.2	-17.1	-16.9	-18.9
03-09.01	1704.7	7.0	-270.8	-160.9	-166.5	-508.7	-835.2	-743.8
		0.4	-13.7	-8.6	-8.9	-23.0	-32.9	-30.4
Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	1229.2	152.7	70.2	58.1	-22.4	-237.4	-46.5	-31.9
		14.2	6.1	5.0	-1.8	-16.2	-3.6	-2.5
03-09.01	869.0	-39.1	41.7	45.0	-180.8	-243.6	-88.3	-37.3
		-4.3	5.0	5.5	-17.2	-21.9	-9.2	-4.1
Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)								
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.12-09.01	2975.8	-79.7	-712.1	29.4	-570.6	-564.4	-553.4	-638.8
		-2.6	-19.3	1.0	-16.1	-15.9	-15.7	-17.7
03-09.01	2194.1	-101.0	-487.5	277.8	-464.5	-271.8	-400.3	-590.9
		-4.4	-18.2	14.5	-17.5	-11.0	-15.4	-21.2

Таблица 7 – Экстремальные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по Южный Океан

Южный Океан				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	4305.1 09.01.2019	9156.4 03.01.2015	6139.8	6042.0
Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	1420.8 09.01.1981	4013.4 03.01.2015	2448.5	2409.2
Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	670.3 09.01.1983	1309.7 03.01.2014	906.3	878.8
Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.01	1753.6 09.01.2019	3994.1 03.01.2015	2785.0	2767.0




Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости (площади распространения морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по 09.01.2022 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS




Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости (площади морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по 09.01.2022 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS




Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения средней общей сплоченности Арктики и Антарктики с 07.11.1978 по 09.01.2022 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS

**Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана**

Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2020 гг.

03-09.01

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2022гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	13778.9	329.1	345.9	755.5	548.9	640.5	615.3	-135.4	12612.5	15172.5	13914.3	13966.5
		2.4	2.6	5.8	4.1	4.9	4.7	-1.0	03.01.2018	09.01.1979		
<b>Сектор 45°W-95°E</b>	3336.0	446.8	592.5	755.8	252.9	610.0	484.3	-28.9	2418.0	4473.7	3364.9	3377.8
		15.5	21.6	29.3	8.2	22.4	17.0	-0.9	03.01.2016	09.01.1982		
Гренландское море	631.9	-3.4	62.8	52.3	41.0	-84.4	13.9	-103.3	530.3	1085.9	735.2	697.1
		-0.5	11.0	9.0	6.9	-11.8	2.2	-14.0	03.01.2016	09.01.1982		
Баренцево море	687.5	317.0	344.3	462.4	137.9	430.0	312.2	66.9	158.9	1081.3	620.7	639.4
		85.6	100.3	205.3	25.1	166.9	83.2	10.8	04.01.2016	06.01.1982		
Карское море	839.2	4.3	52.3	112.2	0.5	107.7	44.8	13.7	654.0	839.2	825.5	839.2
		0.5	6.6	15.4	0.1	14.7	5.6	1.7	07.01.2021	03.01.1979		
<b>Сектор 95°E-170°W</b>	4215.5	-220.7	-278.2	-74.1	31.9	-8.9	19.9	-104.6	3908.5	4781.0	4320.2	4326.9
		-5.0	-6.2	-1.7	0.8	-0.2	0.5	-2.4	03.01.2014	09.01.1995		
Море Лаптевых	674.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	673.6	674.3	674.3	674.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	03.01.1994	03.01.1979		
Восточно-Сибирское море	915.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	915.1	915.1	915.1	915.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	03.01.1979	03.01.1979		
Чукотское море	597.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	579.0	597.3	597.0	597.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	09.01.2017	03.01.1979		
Берингово море	542.4	-106.4	-212.1	112.0	57.6	210.3	122.0	34.1	124.2	976.3	508.3	514.9
		-16.4	-28.1	26.0	11.9	63.3	29.0	6.7	08.01.2018	09.01.2000		
<b>Сектор 170°W-45°W</b>	6227.4	103.0	31.6	73.9	264.1	39.4	111.1	-1.8	5512.5	6882.1	6229.2	6200.7
		1.7	0.5	1.2	4.4	0.6	1.8	0.0	07.01.2011	09.01.1983		
Море Бофорта	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	486.6	486.6	486.6	486.6
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	03.01.1979	03.01.1979		
Гудзонов залив	837.2	-1.8	-1.8	0.1	0.0	0.0	-0.3	2.1	718.3	839.0	835.1	839.0
		-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	07.01.2011	03.01.1979		
Море Лабрадор	25.9	-8.7	-44.5	-155.4	10.5	-31.2	-82.6	-123.0	2.6	392.1	148.9	145.3
		-25.2	-63.2	-85.7	68.5	-54.7	-76.1	-82.6	07.01.2011	09.01.1993		
Дейвисов пролив	309.1	-29.2	-138.9	-144.4	-6.9	-35.1	-62.1	-93.7	186.5	709.4	402.8	389.5
		-8.6	-31.0	-31.8	-2.2	-10.2	-16.7	-23.3	08.01.2011	09.01.1983		
Канадский архипелаг	1189.9	-0.2	2.8	-0.2	1.9	-0.2	0.3	3.7	1022.2	1190.1	1186.3	1190.1
		0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	07.01.2011	03.01.1979		

10.12-09.01

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2022гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	13036.4	299.4	276.5	462.8	465.0	483.1	477.7	-251.1	10826.1	15172.5	13287.5	13311.9
		2.4	2.2	3.7	3.7	3.8	3.8	-1.9	10.12.2016	09.01.1979		
<b>Сектор 45°W-95°E</b>	3116.7	285.6	453.2	549.3	113.4	447.1	377.9	-110.9	2001.9	4473.7	3227.6	3250.8
		10.1	17.0	21.4	3.8	16.7	13.8	-3.4	24.12.2016	09.01.1982		
Гренландское море	595.5	-25.4	-13.7	28.5	6.0	-70.2	-5.3	-113.9	490.3	1085.9	709.4	664.3
		-4.1	-2.2	5.0	1.0	-10.6	-0.9	-16.1	10.12.2016	09.01.1982		
Баренцево море	567.4	248.5	240.8	333.6	76.8	280.0	230.9	-3.1	71.2	1081.3	570.4	597.3
		77.9	73.7	142.7	15.7	97.4	68.6	-0.5	25.12.2016	06.01.1982		
Карское море	829.2	-6.7	165.0	89.7	-8.5	149.7	76.5	19.1	451.3	839.2	810.1	839.2
		-0.8	24.8	12.1	-1.0	22.0	10.2	2.4	13.12.2020	10.12.1978		
<b>Сектор 95°E-170°W</b>	4044.6	-11.5	-145.0	30.0	173.5	145.8	114.9	-4.2	3331.6	4781.0	4048.8	4032.3
		-0.3	-3.5	0.7	4.5	3.7	2.9	-0.1	10.12.2007	09.01.1995		
Море Лаптевых	674.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	673.6	674.3	674.3	674.3
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.12.1993	10.12.1978		
Восточно-Сибирское море	915.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	893.2	915.1	915.1	915.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.12.2007	10.12.1978		
Чукотское море	597.3	7.3	0.0	0.0	39.7	21.2	18.4	6.1	317.4	597.3	591.2	597.3
		1.2	0.0	0.0	7.1	3.7	3.2	1.0	10.12.2007	10.12.1978		
Берингово море	437.7	23.8	-91.9	47.0	174.1	202.2	116.7	30.1	53.7	976.3	407.6	407.4
		5.8	-17.3	12.0	66.0	85.8	36.3	7.4	12.12.2007	09.01.2000		
<b>Сектор 170°W-45°W</b>	5875.2	25.3	-31.6	-116.5	178.0	-109.8	-15.2	-135.9	4997.9	6882.1	6011.1	6026.0
		0.4	-0.5	-1.9	3.1	-1.8	-0.3	-2.3	10.12.2016	09.01.1983		
Море Бофорта	486.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	485.9	486.6	486.6	486.6
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.12.1992	10.12.1978		
Гудзонов залив	713.1	-88.0	-96.1	-43.0	-109.3	-104.7	-85.4	-90.4	277.2	839.0	803.5	839.0
		-11.0	-11.9	-5.7	-13.3	-12.8	-10.7	-11.2	12.12.1998	10.12.1978		
Море Лабрадор	14.9	-6.0	-24.2	-90.4	6.2	-7.9	-39.2	-71.7	0.5	392.1	86.7	58.5
		-28.6	-61.8	-85.8	71.6	-34.7	-72.5	-82.8	11.12.2010	09.01.1993		
Дейвисов пролив	260.1	-40.1	-106.4	-163.3	-2.0	-32.1	-67.8	-98.3	115.9	709.4	358.3	340.7
		-13.3	-29.0	-38.6	-0.8	-11.0	-20.7	-27.4	10.12.2010	09.01.1983		
Канадский архипелаг	1115.3	-13.7	-12.3	-74.7	-16.1	-45.4	-49.6	-57.4	981.5	1190.1	1172.8	1190.1
		-1.2	-1.1	-6.3	-1.4	-3.9	-4.3	-4.9	20.12.2010	10.12.1978		



Таблица 9 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 гг.  
03-09.01

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2022гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	4767.8	-1128.3	-2124.4	-1284.0	-811.7	-1024.0	-1323.7	-1372.0	4305.1	9156.4	6139.8	6042.0
		-19.1	-30.8	-21.2	-14.5	-17.7	-21.7	-22.3	09.01.2019	03.01.2015		
<b>Атлантический сектор</b>	1704.7	-313.2	-1965.2	-1022.1	-166.5	-508.7	-835.2	-743.8	1420.8	4013.4	2448.5	2409.2
		-15.5	-53.5	-37.5	-8.9	-23.0	-32.9	-30.4	09.01.1981	03.01.2015		
Западная часть моря Уэдделла	1277.1	9.1	-624.8	-530.0	-159.4	-217.7	-415.7	-363.7	1005.5	2221.7	1640.8	1657.2
		0.7	-32.9	-29.3	-11.1	-14.6	-24.6	-22.2	09.01.2002	03.01.2013		
Восточная часть моря Уэдделла	427.6	-322.3	-1340.3	-492.1	-7.1	-290.9	-419.4	-380.1	124.2	1988.8	807.7	778.7
		-43.0	-75.8	-53.5	-1.6	-40.5	-49.5	-47.1	09.01.1989	03.01.2012		
<b>Индоокеанский сектор</b>	869.0	-27.4	-4.1	88.7	-180.8	-243.6	-88.3	-37.3	670.3	1309.7	906.3	878.8
		-3.1	-0.5	11.4	-17.2	-21.9	-9.2	-4.1	09.01.1983	03.01.2014		
Море Космонавтов	193.0	6.2	-27.1	95.5	-19.5	-51.9	-2.2	-11.9	59.3	442.6	204.8	201.9
		3.3	-12.3	98.0	-9.2	-21.2	-1.1	-5.8	09.01.1998	03.01.2011		
Море Содружества	206.5	-144.0	1.4	-11.9	-55.1	-182.9	-19.0	1.7	56.3	425.8	204.8	192.2
		-41.1	0.7	-5.4	-21.1	-47.0	-8.4	0.8	07.01.1994	03.01.2014		
Море Моусона	469.5	110.5	21.5	5.0	-106.2	-8.8	-67.1	-27.1	304.3	724.5	496.6	486.5
		30.8	4.8	1.1	-18.4	-1.8	-12.5	-5.5	09.01.2011	08.01.2013		
<b>Тихоокеанский сектор</b>	2194.1	-787.7	-155.2	-350.6	-464.5	-271.8	-400.3	-590.9	1753.6	3994.1	2785.0	2767.0
		-26.4	-6.6	-13.8	-17.5	-11.0	-15.4	-21.2	09.01.2019	03.01.2015		
Море Росса	1812.5	-797.7	-78.3	-196.5	-448.1	-288.0	-348.0	-553.1	1289.8	3632.8	2365.6	2326.7
		-30.6	-4.1	-9.8	-19.8	-13.7	-16.1	-23.4	09.01.2019	03.01.2015		
Море Беллинсгаузена	381.6	9.9	-76.8	-154.0	-16.4	16.2	-52.2	-37.8	169.8	722.5	419.4	414.4
		2.7	-16.8	-28.8	-4.1	4.4	-12.0	-9.0	09.01.2010	03.01.1987		

10.12-09.01

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2022гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	7136.4	-879.4	-2188.7	-1485.8	-422.0	-1404.6	-1195.6	-1353.6	4305.1	13054.1	8490.1	8350.8
		-11.0	-23.5	-17.2	-5.6	-16.4	-14.3	-15.9	09.01.2019	10.12.2013		
<b>Атлантический сектор</b>	2931.4	-341.2	-1751.2	-1012.0	170.9	-602.8	-595.7	-682.9	1420.8	6241.2	3614.4	3530.9
		-10.4	-37.4	-25.7	6.2	-17.1	-16.9	-18.9	09.01.1981	10.12.2002		
Западная часть моря Уэдделла	1527.7	-100.0	-416.5	-402.0	-147.3	-291.1	-350.6	-306.6	1005.5	2316.2	1834.3	1883.8
		-6.1	-21.4	-20.8	-8.8	-16.0	-18.7	-16.7	09.01.2002	21.12.2012		
Восточная часть моря Уэдделла	1403.7	-241.2	-1334.7	-610.0	318.2	-311.7	-245.1	-376.4	124.2	4058.1	1780.1	1626.7
		-14.7	-48.7	-30.3	29.3	-18.2	-14.9	-21.1	09.01.1989	10.12.2008		
<b>Индоокеанский сектор</b>	1229.2	27.5	-75.3	152.1	-22.4	-237.4	-46.5	-31.9	670.3	2585.5	1261.1	1182.4
		2.3	-5.8	14.1	-1.8	-16.2	-3.6	-2.5	09.01.1983	10.12.2010		
Море Космонавтов	336.4	72.7	37.9	175.0	29.7	-15.4	39.6	2.3	59.3	1079.7	334.1	287.9
		27.6	12.7	108.4	9.7	-4.4	13.3	0.7	09.01.1998	10.12.2010		
Море Содружества	317.6	-162.0	-47.5	22.2	12.6	-137.0	-3.2	2.9	56.3	787.7	314.7	291.4
		-33.8	-13.0	7.5	4.1	-30.1	-1.0	0.9	07.01.1994	10.12.1999		
Море Моусона	575.2	116.8	-65.7	-45.0	-64.7	-85.0	-82.8	-37.1	304.3	1087.6	612.4	597.5
		25.5	-10.3	-7.3	-10.1	-12.9	-12.6	-6.1	09.01.2011	10.12.2013		
<b>Тихоокеанский сектор</b>	2975.8	-565.7	-362.1	-625.9	-570.6	-564.4	-553.4	-638.8	1753.6	5533.8	3614.6	3618.3
		-16.0	-10.8	-17.4	-16.1	-15.9	-15.7	-17.7	09.01.2019	10.12.1998		
Море Росса	2578.3	-550.7	-265.2	-395.7	-479.5	-489.3	-435.0	-535.4	1289.8	5004.7	3113.6	3126.2
		-17.6	-9.3	-13.3	-15.7	-16.0	-14.4	-17.2	09.01.2019	10.12.1998		
Море Беллинсгаузена	397.6	-15.0	-96.9	-230.3	-91.0	-75.1	-118.4	-103.4	169.8	1044.6	500.9	488.3
		-3.6	-19.6	-36.7	-18.6	-15.9	-22.9	-20.6	09.01.2010	10.12.1986		

Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS

03-09.01

Регион	Сев. полярная область	Сектор 45°W-95°E	Гренландское море	Баренцево море
Разность	392.6	115.5	-12.3	104.7
тыс.кв.км/ сут.	56.1	16.5	-1.8	15.0

03-09.01

Регион	Карское море	Сектор 95°E-170°W	Море Лаптевых	Восточно-Сибирское море
Разность	0.0	45.1	0.0	0.0
тыс.кв.км/ сут.	0.0	6.4	0.0	0.0

03-09.01

Регион	Чукотское море	Берингово море	Сектор 170°W-45°W	Море Бофорта
Разность	0.0	126.3	231.9	0.0
тыс.кв.км/ сут.	0.0	18.0	33.1	0.0

03-09.01

Регион	Гудзонов залив	Море Лабрадор	Дейвисов пролив	Канадский архипелаг
Разность	3.2	17.0	43.1	20.2
тыс.кв.км/ сут.	0.5	2.4	6.2	2.9

03-09.01

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Западная часть моря Уэдделла	Восточная часть моря Уэдделла
Разность	-1154.2	-507.4	-241.4	-265.9
тыс.кв.км/ сут.	-164.9	-72.5	-34.5	-38.0

03-09.01

Регион	Индоокеанский сектор	Море Космонавтов	Море Содружества	Море Моусона
Разность	-193.1	-54.6	-52.1	-86.4
тыс.кв.км/ сут.	-27.6	-7.8	-7.4	-12.3

03-09.01

Регион	Тихоокеанский сектор	Море Росса	Море Беллинсгаузена	
Разность	-453.8	-426.1	-27.7	
тыс.кв.км/ сут.	-64.8	-60.9	-4.0	

## Характеристика исходного материала и методика расчетов

Для иллюстрации ледовых условий Арктического региона представлены совмещенные региональные карты ААНИИ [4, 6], Канадской ледовой службы – КЛС [12], Национального ледового центра США – НЛЦ [10], при наличии данных, ГМЦ России [8], НИЦ Планета [9] и ледовой службы Германии. Совмещение карт выполнено путем перекрытия слоев (ААНИИ, слой #1), (ГМЦ России или НИЦ Планета, слой #1), (BSH, слой #1) -> (КЛС, слой #2) -> (обзорная карта НЛЦ, слой #3). Как результат, карты ААНИИ характеризуют ледовые условия морей Гренландского...Бофорта, карты ГМЦ России или НИЦ Планета – Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского, Японского, Белого, карты НЛЦ – Северных частей Тихого и Атлантического океанов и Арктического бассейна (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). карты BSH – Балтийского карты КЛС - морей Бофорта, Канадского архипелага, Баффина, Девисова пролива, Лабрадор, Св. Лаврентия (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). Для ледовых условий и распределения айсбергов Южного океана использованы данные проекта по интегрированному ледовому анализу Южного океана – циркумполярные карты ААНИИ [5, 7], НЛЦ [10, 11] и карты акватории Антарктического полуострова Норвежского метеорологического института (НМИ) [21]. Для построения совмещенных карт используется архив данных в обменном формате ВМО СИГРИД-3 [18] Мирового центра данных по морскому льду (МЦД МЛ) – проекта ВМО «Глобальный Банк Цифровых Данных по Морскому Льду». В пределах отдельного срока выборка карт из архива проводилась по критериям близости карт к сроку выпуска карты ААНИИ с максимальным интервалом времени между картами до 7 суток (день недели выпуска карт ААНИИ – вторник, ГМЦ России – среда, НИЦ Планета – понедельник, BSH – понедельник, КЛС – понедельник, НЛЦ – четверг для морского льда и пятница – для крупных айсбергов Южного океана, НМИ - понедельник).

Для иллюстрации полей толщин льда СЛО использованы ежедневные данные по распределению средневзвешенной толщины льда численной модели НУСОМ-СІСЕ Датского метеорологического института (ДМИ) [20]. Численная модель НУСОМ-СІСЕ имеет разрешение 10x10 км и является совместной моделью морского льда – океана. Портал полярных данных ДМИ [22] используется также как источник данных по оценке объема льда СЛО, температуры поверхности океана/морского льда, аномалий температуры воздуха и поля приземного ветра.

Для иллюстрации ледовых условий Северной Полярной области и Южного океана за последние сутки используются ежедневные циркумполярные ледовые информационные продукты НЛЦ США по оценке расположения кромки льда и ледяных массивов - MIZ (Marginal Ice Zone).

Для цветовой окраски карт использован стандарт ВМО (WMO/Td. 1215) [19] для зимнего (по возрасту) и летнего (по общей сплоченности) периодов. Следует также отметить, что в зонах стыковки карт ААНИИ, КЛС и НЛЦ наблюдается определенная несогласованность границ и характеристик ледовых зон вследствие ряда различий в ледовых информационных системах подготавливающих служб. Однако, данная несогласованность несущественна для целей интерпретации ледовых условий в рамках настоящего обзора.

Для получения оценок ледовитости (extent) и приведенной ледовитости – площади льда (area) отдельных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана и климатического положения кромок заданной повторяемости на основе данных спутниковых систем пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS [17] в МЦД МЛ ААНИИ принята следующая технология расчетов:

– источник данных – архивные (Cavalieri et al., 2008, Meier et al., 2006) и квазиоперативные (Maslanik and Stroeve, 1999) с задержкой 1-2 дня ежедневные матрицы (поля распределения) оценок общей сплоченности Северной (севернее 45° с.ш.) и Южной (южнее 50° с.ш.) Полярных областей на основе обработанных по алгоритму NASATEAM данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS ИСЗ

NIMBUS-7 и DMSP за период с 26.10.1978 г. по настоящий момент времени [13, 14, 15], копируемые с сервера НЦДСЛ;

- область расчета – Северная и Южная Полярные области и их регионы с использованием масок океан/суша НЦДСЛ ([http://nsidc.org/data/polar\\_stereo/tools\\_masks.html](http://nsidc.org/data/polar_stereo/tools_masks.html));
- границы используемых масок расчета отдельных меридиональных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана представлены на рисунках П1 – П6, не совпадают с используемыми в НЦДСЛ масками для отдельных акваторий Мирового океана и основаны на номенклатуре ААНИИ для морей Евразийского шельфа (Гренландское - Чукотское), Атласе Северного ледовитого океана (1980) и Атласе океанов (1980) издательства ГУНИО МО [1, 2, 3].
- вычислительные особенности расчета – авторское программное обеспечение ААНИИ с сохранением точности расчетов и оценке статистических параметров по гистограмме распределения и свободно-распространяемое программное обеспечение GDAL для векторизации полей климатических параметров;

В графическом формате PNG совмещенные карты ААНИИ-КЛС-НЛЦ доступны по адресу <http://wdc.aari.ru/datasets/d0040>.

Результаты расчетов ледовитости Северной, Южной полярных областей, их отдельных меридиональных секторов, морей и частей морей доступны на сервере МЦД МЛ ААНИИ в каталогах соответственно <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/north/extent/> и <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/south/extent/>.




Рисунок П1 – Секторальное деление северной полярной области. 1 - Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря); 2 - Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика); 3 - Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское, Японское)




Рисунок П2 – Северный ледовитый океан в официальных границах




Рисунок П3 – моря северной полярной области. 1 – Арктический бассейн; 2- Баренцево море; 3 – Карское море; 4 – море Лаптевых; 5 - Восточно-Сибирское море; 6 – Чукотское море; 7 – море Бофорта; 8 – Канадский архипелаг; 9 – море Линкольна; 10 – Гренландское море; 11 – Норвежское море; 12 – Балтийское море; 13 – Белое море; 14 – Берингово море; 15 – Охотское море; 16 – Японское море; 17 – море Баффина; 18 – Дейвисов пролив; 19 – море Лабрадор; 20 – залив Святого Лаврентия; 21 – Гудзонов залив.




Рисунок П4 – Сектора и моря северной полярной области. 1 - Белое море; 2- Балтийское море; 3 – Баренцево море (СВ); 4 – Баренцево море (З); 5 - Баренцево море (ЮВ); 6 – Карское море (СВ); 7 – Карское море (ЮЗ); 8 – море Лаптевых (В); 9 – море Лаптевых (З); 10 – Восточно-Сибирское море (З); 11 – Восточно-Сибирское море (В); 12 – Чукотское море; 13 – Берингово море; 14 – Охотское море; 15 – Гренландское море; 16 – Норвежское море; 17 – Канадский архипелаг; 18 – Гудзонов залив; 19 – Дейвисов пролив; 20 - море Баффина; 21 – море Лабрадор; 22 - залив Святого Лаврентия; 23 - море Линкольна; 24 - море Бофорта; 25 - Японское море; 26 - сектор АО (30°з.д. – 10°в.д.); 27 – сектор АО (10°в.д. – 30°в.д.); 28 - сектор АО (30°в.д. – 65°в.д.); 29 - сектор АО (65°в.д. – 96°в.д.); 30 - сектор АО (96°в.д. – 140°в.д.); 31 - сектор АО (140°в.д. – 180°в.д.); 32 - сектор АО (180°в.д. – 156°з.д.); 33 - сектор АО (156°з.д. – 123°з.д.); 34 - сектор АО (123°з.д. – 30°з.д.).




Рисунок П5 – Секторальное деление Южного океана. 1 - Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла); 2 - Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона); 3 - Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок П6 – Моря Южного океана. 1 – Западная часть моря Уэдделла; 2- Восточная часть моря Уэдделла; 3 – Море Космонавтов; 4 – море Содружества; 5 – море Моусона; 6 – море Росса; 7 – Море Беллинсгаузена.



## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. – 1980. М: Изд. ГУНИО МО СССР ВМФ – 184 с.
2. Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные таблицы. - Изд. ВМФ МО СССР.-1980.
3. Границы океанов и морей. – 1960. Л.: Изд. ГУНИО ВМФ. – 51 с.
4. Обзорные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» Северного Ледовитого океана за 2008-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
5. Комплексные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» Южного океана за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
6. Комплексные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» арктических и замерзающих морей России за 1997-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0004>.
7. Карты ФГБУ «ААНИИ» анализа крупных айсбергов Южного океана за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
8. Комплексные ледовые карты ФГБУ «Гидрометцентр России» Азовского, Каспийского и Белого морей за 2000-2017 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0033>.
9. Комплексные ледовые карты ФГБУ «НИЦ Планета» Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского и Японского морей за 2016-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0034>.
10. Комплексные ледовые карты Северной полярной области и Южного океана Национального ледового центра США за 2003-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
11. Карты анализа крупных айсбергов Южного океана Национального ледового центра США за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
12. Комплексные ледовые карты Канадской Арктики Канадской ледовой службы за 2006-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0031>.
13. Cavalieri, D., C. Parkinson, P. Gloersen, and H. J. Zwally. 1996, updated 2008. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [1978.10.26 – 2007.12.31]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
14. Meier, W., F. Fetterer, K. Knowles, M. Savoie, M. J. Brodzik. 2006, updated quarterly. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [2008.01.01 – 2008.03.25]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
15. Maslanik, J., and J. Stroeve. 1999, updated daily. *Near-Real-Time DMSP SSM/I-SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations*, [2008.03.26 – present moment]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
16. Andersen, S., R. Tonboe, L. Kaleschke, G. Heygster, and L. T. Pedersen, Intercomparison of passive microwave sea ice concentration retrievals over the high-concentration Arctic sea ice.// *J. Geophys. Res.* – 2007. – Vol. 112. C08004, doi:10.1029/2006JC003543.
17. Статистические характеристики сплоченности морского льда Северной полярной области и Южного океана на основе данных наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi>.

18. SIGRID-3: A vector archive format for Sea Ice Georeferenced Information and Data - JCOMM Technical Report Series No. 23, 2014, WMO/TD-No.1214.

19. Ice Chart Colour Code Standard. - JCOMM Technical Report Series No. 24, 2004, WMO/TD-No.1215.

([http://jcomm.info/index.php?option=com\\_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914](http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914))

20. Danish Meteorological Institute North Atlantic - Arctic Ocean model HYCOM-CICE - <http://ocean.dmi.dk/models/hycom.uk.php>

21. Портал данных ледового анализа Южного океана Норвежского метеорологического института - <http://polarview.met.no/Antarctic.html>

22. Портал полярных данных Датского метеорологического института - <http://polarportal.dk>