



ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»

МЦД МЛ

Информационные материалы по мониторингу морского ледяного покрова Арктики и Южного Океана на основе данных ледового картирования и пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS-AMSR₂

03.10.2022 – 11.10.2022

№ 42(577)

Санкт-Петербург 2022

тел. +7(812)337-3149, эл. почта: vms@aari.aq

Адрес в сети Интернет: <http://wdc.aari.ru/datasets/do042/>

Содержание

Северное Полушарие	4
Рисунок 1а – Ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю (цветовая окраска по общей сплоченности)	
Рисунок 1б – Ледовая карта СЛО и повторяемость кромки за текущую неделю (цветовая окраска по преобладающему возрасту)	
Рисунок 1в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов СЛО за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США	6
Рисунок 2а – Обзорная ледовая карта СЛО за текущую неделю и аналогичные периоды 2007-2019.8	
Рисунок 2б – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института	9
Рисунок 2в – Поля распределения средней за 36-часовые промежутки температуры поверхности морского льда и океана Датского метеорологического института	10
Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики по расчетам МЦД МЛ ААНИИ, источник данных EUMETSAT OSISAF, AMSR-2	11
Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института	12
Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные вектора скорости ветра (10 м)	13
Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Северной полярной области за текущую неделю по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS	17
Таблица 2 – Медианные значения ледовитости для Северной полярной области и 3-х меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2016 гг. и интервалов 2006-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS	17
Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM	17
Рисунок 3а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и её трех меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам ..	20
Рисунок 3б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области с 26.10.1978 по текущий момент времени	21
Рисунок 4 – Медианные распределения сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за те же промежутки за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM	
Южный океан	22
Рисунок 5 а,б – Ледовая карта Южного Океана за последний доступный срок (окраска по общей сплоченности и преобладающему возрасту)	19,23
Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных и сплоченных льдов Южного Океана за последний доступный срок на основе ледового анализа НЛЦ США	24
Рисунок 5д – Анализ ААНИИ крупных айсбергов Южного океана	
Таблица 4 – Параметры крупных айсбергов Южного океана на основе анализа ААНИИ	23
Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени по годам	28
Рисунок 7б – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и его трёх меридиональных секторов за период с 26.10.1978 по текущий момент времени	29
Рисунок 8 – Медианные распределения общей сплоченности льда за текущие 7 дневные промежутки (слева) и её разности относительно медианного распределения за тот же промежуток за периоды 1979-2020 (центр) и 2009-2020 гг. (справа) на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM	
Таблица 5 – Динамика изменения значений ледовитости для акваторий Южного океана за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS	30
Таблица 6 – Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2011-2016 гг. и интервалов 2007-2017 гг. и 1978-2017 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM	30
Таблица 7 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM	30

Земля в целом

Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS	31
Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS	32
Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения общей сплоченности Арктики и Антарктики с 26.10.1978 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS	33
Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана	34
Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 гг.....	34
Таблица 9 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017	34
Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS	38
Характеристика исходного материала и методика расчетов	34
Список источников	44

Северное Полушарие




Рисунок 1а – Обзорная ледовая карта СЛО за 06.10-11.10.2022 г. (цветовая раскраска по общей сплощенности) на основе ледового анализа ААНИИ (11.10), NOAA Аляска (11.10), Канадской ледовой службы (-) и Национального ледового центра США (06.10) и повторяемость кромки за 11-15.10 за период 1991-2020гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 16 – Обзорная ледовая карта СЛО за 06.10-11.10.2022 г. (цветовая раскраска по преобладающему возрасту) на основе ледового анализа ААНИИ (11.10), NOAA Аляска (11.10), Канадской ледовой службы (-) и Национального ледового центра США (06.10) и повторяемость кромки за 11-15.10 за период 1991-2020гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM).




Рисунок 1в – Положение кромки льда и зон разреженных (<8/10) и сплоченных ($\geq 8/10$) льдов СЛО за 11.10.2022 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США и повторяемость кромки за 11-15.10 за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM), совмещенное с положением разрежений на основе данных ИСЗ AMSR2 за 12.10.2022 (AWI, v110).





Рисунок 1г – Обзорная ледовая карта СМП за 11.10.2022 г. (цветовая раскраска по общей сплощенности – верх, по преобладающему возрасту - низ) на основе ледового анализа ААНИИ (11.10), NOAA Аляска (11.10), Канадской ледовой службы (-) и Национального ледового центра США (-) и повторяемость кромки за 11-15.10 за период 1991-2020гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM). Положение РСД ЛСП представлено за 12.10.2022 1700МСК




Рисунок 2а – Оценка сплошности морского льда за 06.10-11.10.2022г. и аналогичные периоды 2007-2021гг. на основе ледового анализа ААНИИ, НИЦ Планета, Канадской ледовой службы и Национального ледового центра США.




Рисунок 2б – Поля распределения средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института 11.10 за 2004–2022 гг.




Рисунок 2в – Поля распределения средней за 36-часовые промежутки температуры поверхности морского льда и океана Датского метеорологического института на основе статистической обработки ИК-каналов AVHRR ИСЗ MetOp-A за 08.10-11.10 2019-2022 гг. (<http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-temperature/#c8099>)

Ice drift speed for 20221003T1200-20221010T1200




Рисунок 2г – Поле дрейфа морского льда Арктики за последние 7 суток, источник данных EUMETSAT OSISAF.

Arctic Sea Ice Volume, 11-Oct-2022






Рисунок 2д – Ежедневные оценки сезонного хода объема морского льда СЛО на основе расчетов средневзвешенной толщины льда совместной модели морского льда – океана HYCOM/CICE Датского метеорологического института с 14.01.2004 по 11.10.2022 гг.

Oct 7 to Oct 11, 2022



polarportal.dk



Oct 7 to Oct 11, 2021




polarportal.org

Рисунок 2е – Аномалии приземной температуры воздуха (2м) и осредненные векторы скорости ветра (10 м) за 07.10 - 11.10 в 2021-2022 гг. относительно периода 2004-2013 гг. (<http://polarportal.dk>)

Oct 7 to Oct 11, 2022



Oct 7 to Oct 11, 2021



polarportal.org

Рисунок 2ж – Аномалии приземной суммы осадков за 07.10-11.10 в 2021-2022 гг. относительно периода 2004-2013 гг. (<http://polarportal.dk>)




Рисунок 3а – Реанализ ERA5 температуры воздуха на уровне 2м ($^{\circ}$ С) и атмосферного давления на уровне моря (гПа) за период 29.09 – 05.10.2022 г.: (а) – осредненные значения, (б) – аномалия относительно периода 1991-2020 гг. и (в) – ранг за период 1979-2022 гг.




Рисунок 3б – Реанализ ERA5 температуры поверхности воды ($^{\circ}\text{C}$) за период 29.09 – 05.10.2022 г.: (а) – осредненные значения, (б) – аномалия относительно периода 1991-2020 гг. и (в) – ранг за период 1979-2022 гг.

Таблица 1 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области 03.10 – 09.10.2022 г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SMIS


Регион	Северная полярная область	Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)	Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)	Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)	Северный Ледовитый океан	Моря СМП (моря Карское-Чукотское)
Разность	404.0	65.2	250.5	88.3	371.5	153.7
тыс.кв.км/сут.	57.7	9.3	35.8	12.6	53.1	22.0

Таблица 2 - Медианные значения ледовитости для Северной полярной области, 3-х меридиональных секторов и моря СМП за текущие 30 и 7-дневные интервалы, и её аномалии от 2016-2020 гг. и интервалов 2011-2021 гг. и 1978-2021 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM


Северная полярная область							
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%					
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг
10.09-09.10	5245.0	188.2	452.6	759.2	946.8	-41.5	372.6
		3.7	9.4	16.9	22.0	-0.8	7.6
03-09.10	5784.1	154.8	702.1	895.5	999.3	-44.6	372.9
		2.7	13.8	18.3	20.9	-0.8	6.9
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)							
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%					
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг
10.09-09.10	1259.8	123.4	211.4	38.8	285.6	261.0	114.9
		10.9	20.2	3.2	29.3	26.1	10.0
03-09.10	1275.4	46.6	113.2	-2.7	143.5	97.7	20.7
		3.8	9.7	-0.2	12.7	8.3	1.6
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)							
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%					
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг
10.09-09.10	1554.0	-111.9	341.5	466.8	748.6	20.2	199.2
		-6.7	28.2	42.9	93.0	1.3	14.7
03-09.10	1821.6	-128.5	622.3	606.6	961.7	71.1	249.9
		-6.6	51.9	49.9	111.8	4.1	15.9
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)							
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%					
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг
10.09-09.10	2431.2	176.8	-100.3	253.6	-87.5	-322.6	58.5
		7.8	-4.0	11.6	-3.5	-11.7	2.5
03-09.10	2687.2	236.6	-33.4	291.5	-105.8	-213.4	102.4
		9.7	-1.2	12.2	-3.8	-7.4	4.0
Северный Ледовитый океан							
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%					
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг
10.09-09.10	4947.6	-25.8	244.9	548.3	953.2	-57.0	216.6
		-0.5	5.2	12.5	23.9	-1.1	4.6
03-09.10	5430.0	-77.0	502.0	679.5	1037.0	-89.5	207.6
		-1.4	10.2	14.3	23.6	-1.6	4.0
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)							
Месяц	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%					
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг
10.09-09.10	354.2	-47.2	182.8	269.0	324.2	72.5	105.0
		-11.8	106.7	315.4	1081.2	25.7	42.1
03-09.10	509.9	-133.5	350.6	399.8	470.3	56.3	138.1
		-20.7	220.1	363.3	1187.1	12.4	37.1

Таблица 3 – Экстремальные и средние значения ледовитости для Северной полярной области, 3 меридиональных секторов и моря СМП за текущий 7-дневный интервал по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM.


Северная полярная область				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	4117.3 04.10.2012	9160.2 09.10.1986	6945.1	7214.0
Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	971.1 03.10.2013	2378.4 09.10.1988	1646.5	1604.6
Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	790.6 03.10.2020	3439.3 08.10.1983	2336.0	2468.6
Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	1793.9 04.10.2012	3686.1 09.10.1983	2962.7	2991.9
Северный Ледовитый океан				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	3996.0 03.10.2012	8996.3 09.10.1986	6772.5	7068.7
Моря СМП (моря Карское-Чукотское)				
Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	31.8 08.10.2020	2442.2 09.10.1996	1190.6	1242.0




а)



б)



в)



г)





Рисунок За – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости для Северной Полярной Области и трех меридиональных секторов за период 26.10.1978 - 11.10.2022 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритмы NASATEAM: а) Северная полярная область, б) сектор 45°W-95°E (Гренландское – Карское моря), в) сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых – Чукотское и Берингово, Охотское), г) сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика), д) Северный Ледовитый океан, е) Северный морской путь (Карское - Чукотское моря).




Рисунок 3б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Северной Полярной Области за период 26.10.1978 – 11.10.2022 на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.

Южный океан




Рисунок 5а – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по общей сплощенности) и расположение крупных айсбергов на основе ледового анализа за 06.10.2022 в рамках проекта совместного ледового картирования Южного океана ААНИИ, НЛЦ США и НМИ.




Рисунок 5в – Ледовая карта Южного океана (цветовая окраска по возрасту) и расположение крупных айсбергов на основе ледового анализа за 06.10.2022 в рамках проекта совместного ледового картирования Южного океана ААНИИ, НЛЦ США и НМИ.










Рисунок 5в – Положение кромки льда и зон разреженных (<8/10) и сплоченных ($\geq 8/10$) льдов Южного океана за 11.10.2022 г. на основе ледового анализа Национального Ледового Центра США и повторяемость кромки за 11-15.10 за период 1991-2020 гг. по наблюдениям SSMR-SSM/I-SSMIS (алгоритм NASATEAM), совмещенное с положением разрежений на основе данных ИСЗ AMSR2 за 12.10.2022 (AWI, v110).




a)


б)

в)


Рисунок 6а – Реанализ ERA5 температуры воздуха на уровне 2м ($^{\circ}$ С) и атмосферного давления на уровне моря (гПа) за период 29.09 – 05.10.2022 г.: (а) -осредненные значения, (б) – аномалия относительно периода 1991-2020 гг. и (в) – ранг за период 1979-2022 гг.



а)



б)




в)


Рисунок 66 – Реанализ ERA5 температуры поверхности воды (C°) за период 29.09 – 05.10.2022 г.: (а) – осредненные значения, (б) – аномалия относительно периода 1991-2020 гг. и (в) – ранг за период 1979-2022 гг.

Таблица 4 – Линейные размеры крупных айсбергов Южного океана на основе анализа ААНИИ за 25.02.2021 / Table 4 – Southern Ocean tabular icebergs linear dimensions based on AARI analysis for 2021-02-25


Имя/ Name	Длина/ Length км/км	Ширина/ Width км/км	Площадь/ Area кв.км/sq.km	Имя/ Name	Длина/ Length км/км	Ширина/ Width км/км	Площадь/ Area кв.км/sq.km
A23A	74	63	3996	C36	41	28	147
D15A	94	44	3587	D27	15	9	147
B22A	70	44	3192	A63	20	6	144
D28	54	35	1743	A68K	19	4	142
D15B	61	22	1185	B45	13	11	141
A68A	67	24	894	B42	22	7	138
B09B	44	15	603	A68I	35	6	122
D20A	35	17	455	B46	19	7	111
A64	24	17	346	B15AB	20	7	109
C15	22	15	341	B29	20	9	108
A68E	48	13	334	B39	15	7	105
C21B	20	15	317	A68P	48	11	99
A68M	54	19	287	A68N	48	11	97
A69A	19	17	264	C30	17	6	93
C18B	35	7	243	C33	15	7	88
B50	28	11	232	B38	11	7	87
B09I	22	11	211	C24	20	4	85
B09G	20	13	200	C31	17	6	84
B28	17	11	196	C29	9	9	83
B47	22	9	182	B37	15	6	82
A73	17	9	181	A71	15	6	72
A72	20	7	172	B40	11	9	71
A69B	19	13	169	A68G	48	11	64
D23	15	11	164	B49	19	9	60
A70	15	9	159	A68J	24	4	56
D26	35	4	149	A68O	48	11	55
D21B	19	7	147	A68H	20	9	31
C35	13	9	147	A68P	24	4	11



а)



б)



в)

Рисунок 7а – Ежедневные оценки сезонного хода ледовитости Южного Океана и меридиональных секторов за период 26.10.1978 – 11.10.2022 по годам на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM: а) Южный Океан, б) Атлантический сектор (60°W - 30°E , море Уэдделла), в) Индоокеанский сектор (30°E - 150°E , моря Космонавтов, Содружества, Моусона), г) Тихоокеанский сектор (150°E - 60°W , моря Росса, Беллинсгаузена)

г)




Рисунок 7б – Ежедневные оценки сезонных изменений ледовитости для Южного океана за период 26.10.1978 – 11.10.2022 на основе расчетов по данным SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM.

Таблица 5 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Южного океана за 03.10 – 09.10.2022г. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS

Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Индоокеанский сектор	Тихоокеанский сектор
Разность	-97.1	-35.5	-69.4	7.8
тыс.кв.км/сут.	-13.9	-5.1	-9.9	1.1

Таблица 6 - Медианные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущие 30 и 7-дневные интервалы и её аномалии от 2016-2020 гг. и интервалов 2011-2021 гг. и 1978-2021 гг. по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM

Южный Океан

Месяц	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.09-09.10	18027.9	136.6	70.9	-255.9	-808.5	-223.5	-540.8	-521.1
		0.8	0.4	-1.4	-4.3	-1.2	-2.9	-2.8
03-09.10	17897.9	-98.1	-99.2	-390.3	-840.7	-54.8	-608.5	-579.1
		-0.5	-0.6	-2.1	-4.5	-0.3	-3.3	-3.1

Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)

Месяц	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.09-09.10	6938.6	87.8	160.5	-324.9	-732.7	-347.0	-360.2	-424.2
		1.3	2.4	-4.5	-9.6	-4.8	-4.9	-5.8
03-09.10	6873.5	150.7	33.1	-343.1	-677.1	-241.4	-380.3	-455.6
		2.2	0.5	-4.8	-9.0	-3.4	-5.2	-6.2

Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)

Месяц	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.09-09.10	4199.9	-206.2	-264.3	-585.3	-269.2	-219.3	-359.1	-360.2
		-4.7	-5.9	-12.2	-6.0	-5.0	-7.9	-7.9
03-09.10	4201.9	-444.9	-459.0	-540.2	-337.3	-121.4	-411.6	-403.6
		-9.6	-9.8	-11.4	-7.4	-2.8	-8.9	-8.8

Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)

Месяц	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%						
		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2012-2022гг	1978-2022гг
10.09-09.10	6889.4	255.0	174.7	654.2	193.3	342.7	178.4	263.3
		3.8	2.6	10.5	2.9	5.2	2.7	4.0
03-09.10	6822.5	196.1	326.7	493.1	173.6	308.1	183.4	280.0
		3.0	5.0	7.8	2.6	4.7	2.8	4.3

Таблица 7 – Экстремальные значения ледовитости для Южного океана и 3 меридиональных секторов за текущий 7-дневный интервал по Южный Океан

Южный Океан

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	17559.1 09.10.1986	19624.2 03.10.2014	18477.0	18466.6

Атлантический сектор (60°W-30°E, море Уэдделла)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	6631.9 06.10.1990	8298.5 06.10.1980	7329.1	7344.8

Индоокеанский сектор (30°E-150°E, моря Космонавтов, Содружества, Моусона)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	4097.8 07.10.2022	5361.3 08.10.1993	4605.5	4556.5

Тихоокеанский сектор (150°E-60°W, моря Росса, Беллинсгаузена)

Месяц	Минимальное знач.	Максимальное знач.	Среднее знач.	Медиана
03-09.10	5651.0 08.10.1987	7189.6 03.10.1994	6542.4	6524.5




Рисунок 9 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения ледовитости (площади распространения морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по 11.10.2022 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS




Рисунок 10 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения приведенной ледовитости (площади морского льда) Арктики, Антарктики и Земли в целом с 26.10.1978 по 11.10.2022 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS




Рисунок 11 – Ежедневные сглаженные окном 365 суток значения средней общей сплоченности Арктики и Антарктики с 07.11.1978 по 11.10.2022 на основе SSMR-SSM/I-SSMIS

Приложение 1 – Статистические значения ледовитостей по отдельным акваториям Северной Полярной Области и Южного океана

Таблица 8 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Северной полярной области и её отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2020 гг.

03-09.10

Регион	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%							1978-2022гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2020 г	2021 г	2012- 2022гг	1978- 2022гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	5784.1	823.7	1498.3	443.9	999.3	-44.6	372.9	-1161.0	4117.3 04.10.2012	9160.2 09.10.1986	6945.1	7214.0
		16.6	35.0	8.3	20.9	-0.8	6.9	-16.7				
Сектор 45°W- 95°E	1275.4	-308.5	3.1	2.1	143.5	97.7	20.7	-371.1	971.1 03.10.2013	2378.4 09.10.1988	1646.5	1604.6
		-19.5	0.2	0.2	12.7	8.3	1.6	-22.5				
Гренландское море	306.2	-176.4	-88.7	-25.0	-5.8	92.9	2.8	-80.3	151.9 03.10.2017	564.2 06.10.1981	386.5	386.7
		-36.6	-22.5	-7.5	-1.9	43.5	0.9	-20.8				
Баренцево море	12.2	-11.1	3.2	5.6	8.4	-13.4	-7.9	-69.9	0.0 03.10.2015	317.6 03.10.1982	82.1	38.0
		-47.7	35.4	83.3	215.9	-52.4	-39.3	-85.1				
Карское море	24.8	-23.9	14.5	13.2	10.7	-67.1	-10.7	-193.7	3.2 04.10.1995	658.3 09.10.1992	218.5	146.2
		-49.0	139.4	113.8	75.4	-73.0	-30.1	-88.6				
Сектор 95°E- 170°W	1821.6	894.8	687.1	28.9	961.7	71.1	249.9	-514.4	790.6 03.10.2020	3439.3 08.10.1983	2336.0	2468.6
		96.6	60.6	1.6	111.8	4.1	15.9	-22.0				
Море Лаптевых	244.9	-38.8	210.6	63.7	237.1	211.4	128.8	-110.7	7.0 04.10.2020	674.3 03.10.1996	355.6	344.0
		-13.7	614.2	35.2	3074.1	631.2	110.9	-31.1				
Восточно- Сибирское море	228.2	223.0	222.9	39.0	223.8	15.1	35.7	-258.2	3.1 06.10.2007	915.1 06.10.1983	486.4	453.5
		4311.9	4275.6	20.6	5153.6	7.1	18.6	-53.1				
Чукотское море	12.0	7.4	1.9	-9.5	-1.4	-103.1	-15.7	-118.2	0.6 03.10.2007	435.6 08.10.1983	130.2	79.5
		159.8	19.2	-44.1	-10.4	-89.6	-56.8	-90.8				
Берингово море	19.5	4.7	9.6	-7.4	-23.6	-6.3	-0.8	-3.6	2.4 05.10.2008	70.1 09.10.1989	23.1	20.1
		31.8	98.3	-27.6	-54.8	-24.5	-4.0	-15.7				
Сектор 170°W- 45°W	2687.2	237.4	808.1	413.0	-105.8	-213.4	102.4	-275.5	1793.9 04.10.2012	3686.1 09.10.1983	2962.7	2991.9
		9.7	43.0	18.2	-3.8	-7.4	4.0	-9.3				
Море Бофорта	168.7	-36.8	151.5	139.8	-24.6	-53.0	12.1	-98.7	14.8 05.10.2012	486.6 03.10.1996	267.4	254.1
		-17.9	878.4	484.0	-12.7	-23.9	7.7	-36.9				
Гудзонов залив	21.4	-0.7	9.8	2.9	3.4	1.1	3.7	-2.6	5.4 03.10.2019	156.7 05.10.1990	24.0	20.0
		-3.4	85.4	15.8	19.0	5.5	20.8	-11.0				
Море Лабрадор	0.0	-16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.3	0.0 03.10.2011	43.2 04.10.1993	9.3	8.4
		-100.0	-	-	-	-	-	-100.0				
Дейвисов пролив	11.4	0.9	-2.4	0.2	-1.6	-2.2	-1.6	-4.5	4.2 05.10.1988	54.1 08.10.1983	15.9	12.6
		8.2	-17.5	1.6	-12.5	-16.0	-12.6	-28.1				
Канадский архипелаг	423.1	-26.0	156.4	-50.1	-91.9	-46.5	-86.0	-165.5	221.3 04.10.2012	785.7 05.10.1979	588.6	619.8
		-5.8	58.6	-10.6	-17.8	-9.9	-16.9	-28.1				

10.09-09.10

Регион	S, тыс. км ²	Аномалии, тыс км ² /%							1978-2022гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2020 г	2021 г	2012- 2022гг	1978- 2022гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Сев. полярная область	5245.0	776.2	1477.4	430.4	946.8	-41.5	372.6	-1039.9	3346.2	9160.2	6284.9	6298.5
		17.4	39.2	8.9	22.0	-0.8	7.6	-16.5	17.09.2012	09.10.1986		
Сектор 45°W- 95°E	1259.8	-175.0	146.8	54.6	285.6	261.0	114.9	-224.2	789.7	2378.4	1484.0	1428.9
		-12.2	13.2	4.5	29.3	26.1	10.0	-15.1	22.09.2013	09.10.1988		
Гренландское море	297.4	-138.3	-51.2	25.1	19.1	161.9	46.7	-28.7	75.3	564.2	326.1	332.6
		-31.7	-14.7	9.2	6.9	119.4	18.6	-8.8	18.09.2021	06.10.1981		
Баренцево море	6.4	-3.8	3.2	2.5	3.9	-0.3	-8.8	-52.5	0.0	318.1	58.9	28.6
		-36.8	99.0	62.8	154.9	-5.0	-57.8	-89.1	10.09.2011	01.10.1982		
Карское море	22.2	-2.9	10.3	10.9	8.9	-46.3	-5.1	-143.2	2.5	658.3	165.5	110.5
		-11.6	86.4	95.9	67.1	-67.5	-18.7	-86.6	01.10.1995	09.10.1992		
Сектор 95°E- 170°W	1554.0	748.8	628.9	31.1	748.6	20.2	199.2	-495.5	693.2	3439.3	2049.5	2003.9
		93.0	68.0	2.0	93.0	1.3	14.7	-24.2	26.09.2007	08.10.1983		
Море Лаптевых	171.8	-61.3	154.0	1.8	164.1	158.0	95.2	-86.7	6.4	674.3	258.5	235.3
		-26.3	863.0	1.0	2146.7	1142.5	124.2	-33.5	01.10.2020	23.09.1996		
Восточно- Сибирское море	155.8	151.2	151.2	53.9	151.2	40.0	26.8	-234.7	1.2	915.1	390.5	292.1
		3297.1	3258.0	52.9	3260.5	34.5	20.8	-60.1	11.09.2007	06.10.1983		
Чукотское море	4.4	-4.8	0.8	-26.5	0.0	-79.2	-11.8	-105.2	0.0	435.6	109.5	55.4
		-52.5	24.0	-85.8	0.2	-94.8	-73.0	-96.0	25.09.2003	08.10.1983		
Берингово море	6.8	-2.2	4.2	-1.9	-5.3	-0.4	0.4	-3.3	0.0	70.1	10.2	6.0
		-24.3	158.3	-22.0	-43.5	-5.7	6.8	-32.7	10.09.2011	09.10.1989		
Сектор 170°W- 45°W	2431.2	202.5	701.7	344.7	-87.5	-322.6	58.5	-320.2	1608.4	3686.1	2751.4	2812.4
		9.1	40.6	16.5	-3.5	-11.7	2.5	-11.6	10.09.2012	09.10.1983		
Море Бафорта	132.5	-6.9	122.0	112.7	-70.0	-61.8	-0.3	-96.5	3.2	486.6	229.0	214.5
		-4.9	1154.7	568.1	-34.6	-31.8	-0.2	-42.1	11.09.2012	29.09.1996		
Гудзонов залив	12.6	-8.0	2.1	2.1	1.1	-0.7	1.2	-10.6	1.2	156.7	23.2	19.3
		-38.7	19.9	20.0	9.7	-5.0	10.2	-45.6	18.09.2019	05.10.1990		
Море Лабрадор	0.1	-6.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-5.2	0.0	43.2	5.3	3.3
		-98.4	-	400.0	-26.8	25.0	140.9	-98.1	10.09.1995	04.10.1993		
Дейвисов пролив	12.7	-0.5	-4.0	1.8	0.8	1.9	0.1	-4.5	3.1	88.3	17.2	14.1
		-3.8	-23.8	16.0	7.0	17.4	0.9	-26.1	01.10.1999	16.09.1983		
Канадский архипелаг	347.0	-2.5	118.5	-88.3	-100.2	-132.2	-93.1	-154.5	182.4	785.7	501.5	501.8
		-0.7	51.9	-20.3	-22.4	-27.6	-21.2	-30.8	01.10.2012	05.10.1979		

Таблица 9 – Средние, аномалии среднего и экстремальные значения ледовитостей для Южного океана и его отдельных акваторий за текущие 7-дневный (неделя) и 30-дневный промежутки времени по данным наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM за период 1978-2017 гг.

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2022гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2020 г	2021 г	2012- 2022гг	1978- 2022гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	17897.9	-855.0	-1174.5	-89.5	-840.7	-54.8	-608.5	-579.1	17559.1 09.10.1986	19624.2 03.10.2014	18477.0	18466.6
		-4.6	-6.2	-0.5	-4.5	-0.3	-3.3	-3.1				
Атлантический сектор	6873.5	-831.6	-726.8	-596.9	-677.1	-241.4	-380.3	-455.6	6631.9 06.10.1990	8298.5 06.10.1980	7329.1	7344.8
		-10.8	-9.6	-8.0	-9.0	-3.4	-5.2	-6.2				
Западная часть моря Уэдделла	2105.2	-272.8	-192.0	36.4	-298.3	49.0	-182.9	-254.0	1974.0 09.10.1989	3123.8 03.10.1987	2359.2	2337.6
		-11.5	-8.4	1.8	-12.4	2.4	-8.0	-10.8				
Восточная часть моря Уэдделла	4768.3	-558.8	-534.8	-633.2	-378.8	-290.4	-197.4	-201.6	4137.0 09.10.1986	5739.9 04.10.1992	4969.9	5002.1
		-10.5	-10.1	-11.7	-7.4	-5.7	-4.0	-4.1				
Индоокеанский сектор	4201.9	4.2	-810.4	-9.6	-337.3	-121.4	-411.6	-403.6	4097.8 07.10.2022	5361.3 08.10.1993	4605.5	4556.5
		0.1	-16.2	-0.2	-7.4	-2.8	-8.9	-8.8				
Море Космонавтов	1244.7	216.2	21.2	137.8	-52.7	-42.9	-22.5	-8.9	874.9 08.10.1996	1635.7 08.10.2004	1253.6	1242.3
		21.0	1.7	12.5	-4.1	-3.3	-1.8	-0.7				
Море Содружества	1445.2	-84.7	-146.7	22.1	-4.2	-64.2	-83.2	-109.1	1222.7 03.10.1979	1920.4 03.10.2014	1554.3	1540.6
		-5.5	-9.2	1.5	-0.3	-4.3	-5.4	-7.0				
Море Моусона	1512.0	-127.2	-684.9	-169.5	-280.4	-14.2	-305.8	-285.6	1084.3 08.10.1989	2378.8 03.10.1982	1797.6	1799.8
		-7.8	-31.2	-10.1	-15.6	-0.9	-16.8	-15.9				
Тихоокеанский сектор	6822.5	-27.5	362.7	516.9	173.6	308.1	183.4	280.0	5651.0 08.10.1987	7189.6 03.10.1994	6542.4	6524.5
		-0.4	5.6	8.2	2.6	4.7	2.8	4.3				
Море Росса	6294.3	-20.4	578.1	629.6	800.0	611.3	632.1	770.9	4481.0 08.10.1987	6434.0 03.10.2007	5523.4	5511.2
		-0.3	10.1	11.1	14.6	10.8	11.2	14.0				
Море Беллинсгаузена	528.2	-7.1	-215.5	-112.6	-626.4	-303.3	-448.7	-490.8	500.9 06.10.2022	1539.6 03.10.1986	1019.0	1032.9
		-1.3	-29.0	-17.6	-54.3	-36.5	-45.9	-48.2				

10.09-09.10

Регион	S, тыс. км2	Аномалии, тыс км2/%							1978-2022гг			
		2007 г	2012 г	2016 г	2020 г	2021 г	2012- 2022гг	1978- 2022гг	Минимум дата	Максимум дата	Среднее	Медиана
Южный Океан	18027.9	-890.3 -4.7	-1237.9 -6.4	21.0 0.1	-808.5 -4.3	-223.5 -1.2	-540.8 -2.9	-521.1 -2.8	17405.1 15.09.2015	20162.6 20.09.2014	18549.1	18545.4
Атлантический сектор	6938.6	-936.7 -11.9	-607.2 -8.0	-640.7 -8.5	-732.7 -9.6	-347.0 -4.8	-360.2 -4.9	-424.2 -5.8	6520.4 18.09.2018	8384.7 24.09.1980	7362.8	7345.6
Западная часть моря Уэдделла	2160.1	-373.8 -14.8	-226.0 -9.5	-42.4 -1.9	-298.3 -12.1	4.6 0.2	-183.1 -7.8	-251.5 -10.4	1974.0 09.10.1989	3235.0 24.09.1980	2411.6	2397.1
Восточная часть моря Уэдделла	4778.6	-562.8 -10.5	-381.2 -7.4	-598.2 -11.1	-434.4 -8.3	-351.6 -6.9	-177.1 -3.6	-172.7 -3.5	4137.0 09.10.1986	5739.9 04.10.1992	4951.2	4960.8
Индоокеанский сектор	4199.9	26.2 0.6	-801.4 -16.0	-26.8 -0.6	-269.2 -6.0	-219.3 -5.0	-359.1 -7.9	-360.2 -7.9	3935.3 15.09.2015	5361.3 08.10.1993	4560.1	4519.3
Море Космонавтов	1208.0	185.6 18.1	-16.5 -1.3	132.8 12.4	-57.7 -4.6	-25.5 -2.1	-42.5 -3.4	-21.5 -1.7	874.9 08.10.1996	1635.7 08.10.2004	1229.5	1220.5
Море Содружества	1374.5	-182.7 -11.7	-253.6 -15.6	-25.5 -1.8	-36.5 -2.6	-157.8 -10.3	-129.0 -8.6	-167.0 -10.8	1124.9 19.09.1979	1934.1 25.09.2014	1541.5	1544.8
Море Моусона	1617.3	23.3 1.5	-531.3 -24.7	-134.2 -7.7	-175.0 -9.8	-35.9 -2.2	-187.6 -10.4	-171.7 -9.6	1084.3 08.10.1989	2435.1 13.09.1982	1789.0	1784.5
Тихоокеанский сектор	6889.4	20.1 0.3	170.7 2.5	688.5 11.1	193.3 2.9	342.7 5.2	178.4 2.7	263.3 4.0	5651.0 08.10.1987	7478.5 10.09.2000	6626.1	6619.3
Море Росса	6220.1	-21.1 -0.3	428.3 7.4	789.0 14.5	651.1 11.7	581.7 10.3	581.2 10.3	676.9 12.2	4481.0 08.10.1987	6457.4 02.10.2007	5543.2	5535.9
Море Беллинсгаузена	669.3	41.2 6.6	-257.6 -27.8	-100.5 -13.1	-457.8 -40.6	-239.0 -26.3	-402.8 -37.6	-413.6 -38.2	494.0 29.09.2007	1821.3 20.09.2015	1082.9	1089.5

Таблица 10 – Динамика изменения значений ледовитости по сравнению с предыдущей неделей для морей Северной полярной области и Южного океана за текущий 7-дневный (неделя) промежуток времени по данным наблюдений SSMIS

03-09.10				
Регион	Сев. полярная область	Сектор 45°W-95°E	Гренландское море	Баренцево море
Разность	404.0	65.2	11.8	7.7
тыс.кв.км/ сут.	57.7	9.3	1.7	1.1
03-09.10				
Регион	Карское море	Сектор 95°E-170°W	Море Лаптевых	Восточно-Сибирское море
Разность	7.1	250.5	85.9	49.7
тыс.кв.км/ сут.	1.0	35.8	12.3	7.1
03-09.10				
Регион	Чукотское море	Берингово море	Сектор 170°W-45°W	Море Бофорта
Разность	10.9	14.9	88.3	34.8
тыс.кв.км/ сут.	1.6	2.1	12.6	5.0
03-09.10				
Регион	Гудзонов залив	Море Лабрадор	Дейвисов пролив	Канадский архипелаг
Разность	11.2	-0.1	-1.1	32.7
тыс.кв.км/ сут.	1.6	0.0	-0.2	4.7
03-09.10				
Регион	Южный Океан	Атлантический сектор	Западная часть моря Уэдделла	Восточная часть моря Уэдделла
Разность	-97.1	-35.5	-9.9	-25.7
тыс.кв.км/ сут.	-13.9	-5.1	-1.4	-3.7
03-09.10				
Регион	Индоокеанский сектор	Море Космонавтов	Море Содружества	Море Моусона
Разность	-69.4	-32.3	35.9	-73.0
тыс.кв.км/ сут.	-9.9	-4.6	5.1	-10.4
03-09.10				
Регион	Тихоокеанский сектор	Море Расса	Море Беллинсгаузена	
Разность	7.8	59.5	-51.7	
тыс.кв.км/ сут.	1.1	8.5	-7.4	

Характеристика исходного материала и методика расчетов

Для иллюстрации ледовых условий Арктического региона представлены совмещенные региональные карты ААНИИ [4, 6], Канадской ледовой службы – КЛС [12], Национального ледового центра США – НЛЦ [10], при наличии данных, ГМЦ России [8], НИЦ Планета [9] и ледовой службы Германии. Совмещение карт выполнено путем перекрытия слоев (ААНИИ, слой #1), (ГМЦ России или НИЦ Планета, слой #1), (BSH, слой #1) -> (КЛС, слой #2) -> (обзорная карта НЛЦ, слой #3). Как результат, карты ААНИИ характеризуют ледовые условия морей Гренландского...Бофорта, карты ГМЦ России или НИЦ Планета – Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского, Японского, Белого, карты НЛЦ – Северных частей Тихого и Атлантического океанов и Арктического бассейна (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). карты BSH – Балтийского карты КЛС - морей Бофорта, Канадского архипелага, Баффина, Девисова пролива, Лабрадор, Св. Лаврентия (при этом полный охват карт НЛЦ – вся акватория СЛО и субполярные моря). Для ледовых условий и распределения айсбергов Южного океана использованы данные проекта по интегрированному ледовому анализу Южного океана – циркумполярные карты ААНИИ [5, 7], НЛЦ [10, 11] и карты акватории Антарктического полуострова Норвежского метеорологического института (НМИ) [21]. Для построения совмещенных карт используется архив данных в обменном формате ВМО СИГРИД-3 [18] Мирового центра данных по морскому льду (МЦД МЛ) – проекта ВМО «Глобальный Банк Цифровых Данных по Морскому Льду». В пределах отдельного срока выборка карт из архива проводилась по критериям близости карт к сроку выпуска карты ААНИИ с максимальным интервалом времени между картами до 7 суток (день недели выпуска карт ААНИИ – вторник, ГМЦ России – среда, НИЦ Планета – понедельник, BSH – понедельник, КЛС – понедельник, НЛЦ – четверг для морского льда и пятница – для крупных айсбергов Южного океана, НМИ - понедельник).

Для иллюстрации полей толщин льда СЛО использованы ежедневные данные по распределению средневзвешенной толщины льда численной модели HYCOM-CICE Датского метеорологического института (ДМИ) [20]. Численная модель HYCOM-CICE имеет разрешение 10x10 км и является совместной моделью морского льда – океана. Портал полярных данных ДМИ [22] используется также как источник данных по оценке объема льда СЛО, температуры поверхности океана/морского льда, аномалий температуры воздуха и поля приземного ветра.

Для иллюстрации ледовых условий Северной Полярной области и Южного океана за последние сутки используются ежедневные циркумполярные ледовые информационные продукты НЛЦ США по оценке расположения кромки льда и ледяных массивов - MIZ (Marginal Ice Zone).

Для цветовой окраски карт использован стандарт ВМО (WMO/Td. 1215) [19] для зимнего (по возрасту) и летнего (по общей сплошности) периодов. Следует также отметить, что в зонах стыковки карт ААНИИ, КЛС и НЛЦ наблюдается определенная несогласованность границ и характеристик ледовых зон вследствие ряда различий в ледовых информационных системах подготавливающих служб. Однако, данная несогласованность несущественна для целей интерпретации ледовых условий в рамках настоящего обзора.

Для получения оценок ледовитости (extent) и приведенной ледовитости – площади льда (area) отдельных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана и климатического положения кромок заданной повторяемости на основе данных спутниковых систем пассивного микроволнового зондирования SSMR-SSM/I-SSMIS [17] в МЦД МЛ ААНИИ принята следующая технология расчетов:

- источник данных – архивные (Cavalieri et al., 2008, Meier et al., 2006) и квазиоперативные (Maslanik and Stroeve, 1999) с задержкой 1-2 дня ежедневные матрицы (поля распределения) оценок общей сплошности Северной (севернее 45° с.ш.) и Южной (южнее 50° с.ш.) Полярных областей на основе обработанных по алгоритму NASATEAM данных многоканальных микроволновых радиометров SSMR-SSM/I-SSMIS ИСЗ

NIMBUS-7 и DMSP за период с 26.10.1978 г. по настоящий момент времени [13, 14, 15], копируемые с сервера НЦДСЛ;

- область расчета – Северная и Южная Полярные области и их регионы с использованием масок океан/суша НЦДСЛ (http://nsidc.org/data/polar_stereo/tools_masks.html);
- границы используемых масок расчета отдельных меридиональных секторов, морей, частей морей Северной полярной области и Южного океана представлены на рисунках П1 – П6, не совпадают с используемыми в НЦДСЛ масками для отдельных акваторий Мирового океана и основаны на номенклатуре ААНИИ для морей Евразийского шельфа (Гренландское - Чукотское), Атласе Северного ледовитого океана (1980) и Атласе океанов (1980) издательства ГУНИО МО [1, 2, 3].
- вычислительные особенности расчета – авторское программное обеспечение ААНИИ с сохранением точности расчетов и оценке статистических параметров по гистограмме распределения и свободно-распространяемое программное обеспечение GDAL для векторизации полей климатических параметров;

В графическом формате PNG совмещенные карты ААНИИ-КЛС-НЛЦ доступны по адресу <http://wdc.aari.ru/datasets/d0040>.

Результаты расчетов ледовитости Северной, Южной полярных областей, их отдельных меридиональных секторов, морей и частей морей доступны на сервере МЦД МЛ ААНИИ в каталогах соответственно <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/north/extent/> и <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi/data/south/extent/>.




Рисунок П1 – Секторальное деление северной полярной области. 1 - Сектор 45°W-95°E (Гренландское - Карское моря); 2 - Сектор 170°W-45°W (море Бофорта и Канадская Арктика); 3 - Сектор 95°E-170°W (моря Лаптевых - Чукотское, Берингово, Охотское, Японское)




Рисунок П2 – Северный ледовитый океан в официальных границах




Рисунок П3 – Моря северной полярной области. 1 – Арктический бассейн; 2- Баренцево море; 3 – Карское море; 4 – море Лаптевых; 5 - Восточно-Сибирское море; 6 – Чукотское море; 7 – море Бофорта; 8 – Канадский архипелаг; 9 – море Линкольна; 10 – Гренландское море; 11 – Норвежское море; 12 – Балтийское море; 13 – Белое море; 14 – Берингово море; 15 – Охотское море; 16 – Японское море; 17 – море Баффина; 18 – Дейвисов пролив; 19 – море Лабрадор; 20 – залив Святого Лаврентия; 21 – Гудзонов залив.




Рисунок П4 – Сектора и моря северной полярной области. 1 - Белое море; 2- Балтийское море; 3 – Баренцево море (СВ); 4 – Баренцево море (З); 5 - Баренцево море (ЮВ); 6 – Карское море (СВ); 7 – Карское море (ЮЗ); 8 – море Лаптевых (В); 9 – море Лаптевых (З); 10 – Восточно-Сибирское море (З); 11 – Восточно-Сибирское море (В); 12 –Чукотское море; 13 – Берингово море; 14 – Охотское море; 15 –Гренландское море; 16 – Норвежское море; 17 – Канадский архипелаг; 18 – Гудзонов залив; 19 – Дейвисов пролив; 20 - море Баффина; 21 – море Лабрадор; 22 - залив Святого Лаврентия; 23 - море Линкольна; 24 - море Бофорта; 25 - Японское море; 26 - сектор АО (30° з.д. – 10° в.д.); 27 – сектор АО (10° в.д. – 30° в.д.); 28 - сектор АО (30° в.д. – 65° в.д.); 29 - сектор АО (65° в.д. – 96° в.д.); 30 - сектор АО (96° в.д. – 140° в.д.); 31 - сектор АО (140° в.д. – 180° в.д.); 32 - сектор АО (180° в.д. – 156° з.д.); 33 - сектор АО (156° з.д. – 123° з.д.); 34 - сектор АО (123° з.д. – 30° з.д.).




Рисунок П5 – Секторальное деление Южного океана. 1 - Атлантический сектор (60°W - 30°E , море Уэдделла); 2 - Индоокеанский сектор (30°E - 150°E , моря Космонавтов, Содружества, Моусона); 3 - Тихоокеанский сектор (150°E - 60°W , моря Росса, Беллинсгаузена)




Рисунок П6 – Моря Южного океана. 1 – Западная часть моря Уэдделла; 2- Восточная часть моря Уэдделла; 3 – Море Космонавтов; 4 – море Содружества; 5 – море Моусона; 6 – море Росса; 7 – Море Беллинсгаузена.

Список источников

1. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан. – 1980. М: Изд. ГУНИО МО СССР ВМФ – 184 с.
2. Атлас океанов. Термины. Понятия. Справочные таблицы. - Изд. ВМФ МО СССР.-1980.
3. Границы океанов и морей. – 1960. Л.: Изд. ГУНИО ВМФ. – 51 с.
4. Обзорные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» Северного Ледовитого океана за 2008-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
5. Комплексные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» Южного океана за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
6. Комплексные ледовые карты ФГБУ «ААНИИ» арктических и замерзающих морей России за 1997-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0004>.
7. Карты ФГБУ «ААНИИ» анализа крупных айсбергов Южного океана за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0015>.
8. Комплексные ледовые карты ФГБУ «Гидрометцентр России» Азовского, Каспийского и Белого морей за 2000-2017 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0033>.
9. Комплексные ледовые карты ФГБУ «НИЦ Планета» Азовского, Каспийского, Берингова, Охотского и Японского морей за 2016-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0034>.
10. Комплексные ледовые карты Северной полярной области и Южного океана Национального ледового центра США за 2003-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
11. Карты анализа крупных айсбергов Южного океана Национального ледового центра США за 2014-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0032>.
12. Комплексные ледовые карты Канадской Арктики Канадской ледовой службы за 2006-2018 гг. в обменном формате ВМО СИГРИД-3 // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/d0031>.
13. Cavalieri, D., C. Parkinson, P. Gloersen, and H. J. Zwally. 1996, updated 2008. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [1978.10.26 – 2007.12.31]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
14. Meier, W., F. Fetterer, K. Knowles, M. Savoie, M. J. Brodzik. 2006, updated quarterly. *Sea Ice Concentrations from Nimbus-7 SMMR and DMSP SSM/I Passive Microwave Data*, [2008.01.01 – 2008.03.25]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
15. Maslanik, J., and J. Stroeve. 1999, updated daily. *Near-Real-Time DMSP SSM/I-SSMIS Daily Polar Gridded Sea Ice Concentrations*, [2008.03.26 – present moment]. Boulder, Colorado USA: National Snow and Ice Data Center. Digital media.
16. Andersen, S., R. Tonboe, L. Kaleschke, G. Heygster, and L. T. Pedersen, Intercomparison of passive microwave sea ice concentration retrievals over the high-concentration Arctic sea ice.// *J. Geophys. Res.* – 2007. – Vol. 112. C08004, doi:10.1029/2006JC003543.
17. Статистические характеристики сплошности морского льда Северной полярной области и Южного океана на основе данных наблюдений SSMR-SSM/I-SSMIS, алгоритм NASATEAM // Мировой центр данных по морскому льду - Глобальный банк данных по морскому льду – <http://wdc.aari.ru/datasets/ssmi>.

18. SIGRID-3: A vector archive format for Sea Ice Georeferenced Information and Data - JCOMM Technical Report Series No. 23, 2014, WMO/TD-No.1214.
19. Ice Chart Colour Code Standard. - JCOMM Technical Report Series No. 24, 2004, WMO/TD-No.1215.
[\(http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914\)](http://jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=4914)
20. Danish Meteorological Institute North Atlantic - Arctic Ocean model HYCOM-CICE - <http://ocean.dmi.dk/models/hycom.uk.php>
21. Портал данных ледового анализа Южного океана Норвежского метеорологического института - <http://polarview.met.no/Antarctic.html>
22. Портал полярных данных Датского метеорологического института - <http://polarportal.dk>